

Neustrilhaarscintigrafie

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Datum onderzoek: _____

Tijdstip onderzoek: _____

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een neustrilhaarscintigrafie aangevraagd.

Doel neustrilhaarscintigrafie

Een neustrilhaarscintigrafie is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de transportfunctie van de neustrilhaartjes.

Trilhaartjes bevinden zich aan de binnenkant van uw neus. In de lucht zweven stofdeeltjes, die neerslaan op het slijmvlies van de neus. Trilhaartjes transporteren deze stofdeeltjes naar de neus-keelholte en verwijderen ze zo uit de neus.

Bij dit onderzoek krijgt u een druppeltje licht radioactieve vloeistof in uw neus; daarna bekijken we hoe de neustrilhaartjes deze vloeistof verplaatsen.

Radioactieve stof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.

Mee te nemen naar het ziekenhuis

- Verzekeringsbewijs
- Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Medicatielijst

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger dan is het van belang dat u vóór het onderzoek telefonisch contact opneemt met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 4 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfdde melk mag na 3 dagen alsnog gegeven worden.

Vorbereiding van het onderzoek

U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken.

Indien u neusdruppels of -spray gebruikt, dient u deze twee dagen voor het onderzoek te staken. Als u de neusdruppels of -spray al langer dan 14 dagen gebruikt, dient u de ze 14 dagen te stoppen. Op deze manier krijgt de zwelling van het neusslijmvlies de kans om te herstellen.

Wanneer u verkouden bent, is het verstandig het onderzoek uit te stellen tot u weer beter bent.

Andere medicijnen kunt u op de dag van het onderzoek gewoon innemen.

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele oorbellen uit te doen.

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om de neus goed leeg te snuiten. U zit tijdens het maken van de foto's in een stoel die voor de gammacamera is gepositioneerd.



U krijgt twee stickertjes op uw gezicht geplakt als markering: boven uw neus en achter uw oor. De nucleair geneeskundige brengt een druppel licht radioactieve vloeistof achter in uw neus met behulp van een pipet. De opnames duren 20 minuten; het is van belang dat u zo stil mogelijk blijft zitten gedurende het onderzoek. Tijdens het onderzoek mag u de neus niet "ophalen" en alleen door de mond ademen.

Het kan zijn dat het onderzoek herhaald moet worden voor het andere neusgat. Het totale onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte

De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.