

Torische implantlenzen bij een staaroperatie

U komt in aanmerking voor een staaroperatie. Hierbij wordt er een nieuwe kunstlens geplaatst. U krijgt deze folder mee omdat er een cilindersterkte is gemeten, die niet gecorrigeerd wordt met de standaard kunstlens. Deze informatiefolder is toegespitst op de torische implantlens en een aanvulling op de informatiefolder 'Staaroperatie'.

Astigmatisme en soorten implantlenzen

Sommige mensen hebben een cilindersterkte in het oog (astigmatisme). Dit houdt in dat het hoornvlies niet mooi rond is, maar een ovale vorm heeft. Het zicht is zonder bril niet optimaal. Wanneer u geopereerd wordt met een standaard implantlens, behoudt u de cilinder na de operatie. Een bril kan deze cilinder corrigeren. U kunt ook kiezen voor een torische implantlens. Deze lens corrigeert de cilinder grotendeels of volledig. Tevens bestaat er een multifocale implantlens. Hierbij is het doel om het zicht in de verte en dichtbij te corrigeren, zodat u na een staaroperatie in principe geen bril meer nodig heeft. De multifocale implantlens wordt in Meander Medisch Centrum niet gebruikt.

Torische implantlenzen

Het doel van de torische implantlens is om in de verte goed zicht te bereiken met een zo min mogelijke brilsterkte; u blijft wel een leesbril dragen. U kunt ook kiezen om dichtbij goed te zien met een zo min mogelijke brilsterkte; dan blijft u een vertebril dragen. Na de operatie kan een reststerkte overblijven, ondanks de zeer nauwkeurige berekening om de juiste lens- en cilindersterkte te bepalen. Dit risico is niet groter dan bij de standaard implantlens. Met de torische implantlens bent u minder afhankelijk van een bril dan met de standaard implantlens.

Het onderzoek

Als u geïnteresseerd bent in torische implantlenzen, zal er meer onderzoek gedaan moeten worden om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Er wordt dan een extra lensmeting en een 3D-scan van het hoornvlies gemaakt. Bij dit onderzoek worden géén pupilvergroterende druppels gebruikt.

Bij gebruik van contactlenzen

Het dragen van contactlenzen heeft invloed op de vorm van het hoornvlies. Vormstabiele (harde) contactlenzen hebben meer invloed dan zachte contactlenzen. Het is erg belangrijk dat zachte contactlenzen voorafgaand aan de onderzoeken minimaal twee weken uitgelaten worden. In geval van vormstabiele contactlenzen zullen wij deze termijn eerst met u bespreken.

De kosten

De kosten voor de torische implantlens worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor de staaroperatie worden wel vergoed. De eigen bijdrage voor een torische implantlens bedraagt €650,- per oog.

Vragen

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben naar aanleiding van deze folder, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via telefoonnummer 033 - 850 60 70.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917