

Bronchoscopie

Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop uw luchtwegen (bronchiën) bekijkt. Een bronchoscoop is een kijkinstrument, waarmee via een dunne buigzame slang en een lens de luchtwegen worden onderzocht. Bovendien kan de arts met dit kijkinstrument zo nodig kleine stukjes weefsel wegnemen.

De specialist wil graag goed op de hoogte zijn over uw gezondheid. Dat is noodzakelijk vanwege het onderzoek dat wordt gedaan naar uw longen. De specialist wil het daarom weten

- wanneer allergisch bent voor geneesmiddelen en/of verdoving
- wanneer u zwanger bent
- wanneer u bloedverduuners gebruikt
- wanneer u diabetes hebt

Indien dit niet bekend is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw specialist. Deze kunt u bereiken via het algemene nummer 033 - 850 50 50.

Opname

Wanneer de bronchoscopie poliklinisch plaatsvindt, wordt u eerst een uur voorafgaande aan het onderzoek opgenomen op Dagbehandeling C7. In enkele gevallen kan het zijn dat u opgenomen wordt op een verpleegafdeling elders in het ziekenhuis. Hier worden eventuele vragen en onduidelijkheden met u besproken. Ook worden uw vitale functies gecontroleerd. Op de afdeling krijgt u een bed toegewezen. Indien iemand u begeleidt kan deze persoon gedurende uw opname wachten in een daarvoor bestemde ruimte op de afdeling of in de ontvangsthal van het ziekenhuis. Wanneer u aan de beurt bent wordt u door een verpleegkundige of een longfunctiemedewerker naar de bronchoscopiekamer gebracht.

De voorbereiding

- Vóór het onderzoek mag u minimaal 6 uur niets meer eten of drinken. Uw medicijnen mag u wel blijven gebruiken en met een klein slokje water innemen.
- Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
- U mag een eventuele gebitsprothese niet inhouden tijdens het onderzoek.

Met behulp van een spray verdooft de arts of verpleegkundige uw keel en mond. Dit is nodig om de reflex tot kokhalzen weg te nemen. De verdovingspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Ook wordt in de luchtwegen nog een verdovingsvloeistof gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. De arts brengt via de neus of de mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de bronchoscoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Vaak wordt via dezelfde

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-/zoutoplossing wordt dan via de bronchoscoop ingespoten. Deze oplossing wordt meteen weer afgezogen. Het afgezogen vocht gaat voor onderzoek naar het laboratorium.

Het spoelen van de luchtwegen en nemen van een biopt zijn meestal pijnloos. Wel treedt soms een hoestprikkel op. Het onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

Na het onderzoek

U wordt weer naar de afdeling gebracht om daar gedurende één tot twee uur, afhankelijk van de situatie, te rusten. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer u weer naar huis mag.

Ten gevolge van het onderzoek is het mogelijk dat u last heeft van:

- een geïrriteerd gevoel in uw keel
- een hese keel
- het moeilijk kunnen slikken. Hierdoor mag u minimaal twee uur
- niets eten en drinken om verslikken te voorkomen. U kunt het
- beste langzaam weer beginnen met eerst wat water of vla.
- een pijnlijk gevoel bij het ademen
- temperatuursverhoging
- het ophoesten van een streepje bloed. Dit verdwijnt binnen 1 tot 2 dagen.

U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. De verschijnselen gaan vanzelf weer over. Bent u toch ongerust, neem dan contact op met de verpleegafdeling of uw specialist.

Indien u voor de bronchoscopie atropine en/of codeïne heeft gekregen en met de auto bent, moeten deze eerst uitgewerkt zijn. Deze medicijnen kunnen invloed hebben op de rijvaardigheid. Na ongeveer twee uur zijn zij uitgewerkt en mag u weer autorijden.

Tot slot

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. U kunt thuis alles nog eens rustig nalezen. Hebt u nog vragen over deze test, schrijft u ze dan op en neem contact op met de functie-afdeling via telefoonnummer 033 - 850 60 70 of stel deze voor de bronchoscopie op de verpleegafdeling aan de verpleegkundige.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van de test aan u meedeelt en met u bespreekt.