

Stereotactisch vacuümbiopt van de borst (mamma)

Kortgeleden is bij u een mammografie, echografie en/of MRI gemaakt waarbij een afwijking was te zien in uw borst. Binnenkort ondergaat u daarom een stereotactische vacuümbiopsie van uw borst. Om de aard van de afwijking te kunnen onderzoeken worden er meerdere stukjes weefsel weggehaald. Om de plaats nauwkeurig te kunnen bepalen maken we gebruik van röntgenstraling.

Het onderzoek

De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer, waar u zich van boven uitkleedt (eventueel sieraden en riem af en schoenen uit). Het onderzoek wordt u uitgelegd en daarna komt u op een stoel te zitten en wordt de aangedane borst opnieuw tussen twee platen geklemd (voelt als een mammografie). Dit blijft zo gedurende de rest van het onderzoek en is noodzakelijk om de beeldkwaliteit te vergroten en beweging te beperken. Het opzoeken van de afwijking en het optimaal in beeld brengen ervan neemt wat tijd in beslag. Als alles in gereedheid is gebracht komt de radioloog de plaatselijke verdoving geven en de biopsie naald plaatsen. Deze naald is gekoppeld aan een vacuümsysteem, waardoor het mogelijk is meerdere biopten te nemen terwijl de naald in de juiste positie blijft. Na het onderzoek wordt een 1 mm groot clipje van titanium of stainless steel geplaatst. Dit clipje is zichtbaar op röntgenfoto's waardoor later nog exact te bepalen is waar het stukje weefsel is weggehaald.

Er ontstaat vrijwel altijd een bloeditstorting in het behandelde gebied. Om dit tot een minimum te beperken wordt het gebied na afloop 10 minuten afgedrukt en vervolgens met hechtpleisters en afplakmateriaal verbonden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt één tot anderhalf uur. Wij adviseren u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis te rijden (of te fietsen).

Vorbereiding

Als u (sterke) bloedverdunders gebruikt moet u deze in overleg met uw behandelend arts enkele dagen voor het onderzoek stoppen. Als u de mammografie pijnlijk hebt gevonden, dan is het raadzaam om circa 1 uur voor de start van het onderzoek 1 à 2 tabletten paracetamol in te nemen. Op de dag van het onderzoek is het aan te raden een stevige bh aan te doen; dit om na het onderzoek wat steun te geven en druk uit te oefenen op het wondje. Hebt u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u iemand meenemen, die u vóór en ná het onderzoek begeleidt; tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de laborant(e). Voor dit onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.

Nazorg

U krijgt een nazorgformulier mee.

Uitslag

Het te onderzoeken borstweefsel gaat naar het pathologisch anatomisch laboratorium waar het wordt onderzocht door de patholoog. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandeld arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917