

Lui oog (amblyopie)

Een lui oog is een oog dat zonder aantoonbare overige afwijkingen en met de juiste brilcorrectie niet goed ziet. De medische benaming voor een lui oog is amblyopie. Een lui oog kan alleen op kinderleeftijd ontstaan en alleen dan worden verholpen. Hoe eerder een lui oog wordt ontdekt, des te beter het oog kan worden behandeld.

Oorzaken

Een lui oog wordt veroorzaakt door een situatie die de normale ontwikkeling van het zien in de weg staat. Dit kan zijn: scheelzien, een brilafwijking, of een andere oogheelkundige afwijking (bijvoorbeeld aangeboren staar of een hangend ooglid). Er kan ook een combinatie van bovenstaande oorzaken aanwezig zijn.

Behandeling

Om een lui oog te behandelen wordt, indien nodig, eerst de brilafwijking gecorrigeerd met behulp van een bril. Na een paar maanden wordt nogmaals de gezichtsscherpte van het kind beoordeeld. Is er na deze periode nog steeds een verschil in gezichtsscherpte, dan is er sprake van een lui oog en wordt er gestart met de behandeling. Afhankelijk van de afwijking kan er gekozen worden om direct te starten met de behandeling.

Bij een lui oog is er een achterstand in de ontwikkeling van het zien. Door het goede oog af te plakken, wordt het luie oog gestimuleerd deze achterstand in te halen en het scherp zien te ontwikkelen. Het afplakken gebeurt bij voorkeur met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde oogpleisters. De orthoptist zal in overleg met u en uw kind bepalen welke behandelmethode geschikt is. Na een paar maanden komt uw kind weer voor controle bij de orthoptist. De orthoptist bepaalt dan of de gekozen behandelmethode effectief is of dat deze aangepast moet worden. Dit traject herhaalt zich, totdat de gewenste gezichtsscherpte van het luie oog bereikt is.

Indien het gaat om een andere oorzaak dan een brilafwijking of scheelzien, zal er samen met u en/of uw kind besproken worden welke behandelmogelijkheden er zijn.

Duur van de behandeling

Voor het slagen van de behandeling is therapietrouw erg belangrijk. Hoe jonger uw kind is, des te effectiever de behandeling van het luie oog zal zijn. De behandeling varieert van een paar maanden tot een aantal jaren. Voor een succesvol resultaat bent u als ouder/verzorger het belangrijkste. U kunt ervoor zorgen dat uw kind de therapie met bril en/of pleister (ver)draagt en dat de behandeling ook lang genoeg wordt volgehouden. De orthoptist zal u hierbij zo goed mogelijk helpen en adviseren.

Tenslotte

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de orthoptist via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 – 850 50 50.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917