

## Metyrapontest

*Uw specialist heeft een Metyrapontest voor u aangevraagd in Meander Medisch Centrum. Uw arts heeft u al de nodige informatie gegeven over het onderzoek. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.*

### Waarom wordt u onderzocht?

Het doel van de Metyrapontest is aan te tonen hoe de hypofyse (een klier middenin het hoofd, onder de hersenen) op de bijnieren werkt. Dit gebeurt door met Metyrapon tijdelijk de productie van cortisol door de bijnierschors stil te leggen. Daarna wordt gemeten of de hypofyse hierop voldoende reageert.

### Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Uw afsprakenkaart.
- Uw verzekeringsbewijs.
- Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
- Uw medicijnen en medicijnenlijst van uw apotheek.

U meldt zich bij de algemene balie. Daar hoort u waar u even kunt wachten of waar u naartoe moet.

Bent u verhinderd? Geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de afdeling. U belt naar Meander Medisch Centrum, telefoonnummer 033 - 850 5050 en vraagt om doorverbonden te worden naar de afdeling.

### Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

- Indien u medicijnen gebruikt, overlegt u dan met de arts of deze wel of niet ingenomen mogen worden.
- Waarschuw uw arts van tevoren als u zwanger bent, of denkt dit te zijn.

### Hoe gaat de Metyrapontest in zijn werk?

U meldt zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken datum en tijd op de afdeling die u vermeld is.

U wordt begin van de avond opgenomen en kan de volgende ochtend meteen na het ontbijt weer naar huis.

Er wordt een infuusnaald bij u ingebracht.

Ook wordt u gewogen. Uw gewicht is namelijk bepalend voor de hoeveelheid Metyrapon die u krijgt.

Tussen 23.30 en 24.00 moet u de Metyrapon innemen met een glas melk of met wat yoghurt. De Metyrapon krijgt u in tabletvorm.

Daarna moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u niet meer mag eten en drinken.

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)  
[mijn.meandermc.nl](http://mijn.meandermc.nl)

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten  
(Gezondheidscentrum Scala Medica)  
Chopinstraat 2D  
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

**Postadres:**  
Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

**Telefoonnummers:**  
Algemeen: 033 - 850 50 50  
Afspraken: 033 - 850 60 70

**KvK Gooi en Eemland:**  
32082917

De volgende ochtend wordt uw bloeddruk gemeten en tussen 9.00 en 9.00 uur wordt er bloed afgenomen uit uw infuusnaald. Mocht dit niet lukken, dan wordt dit via een normale bloedafname gedaan.

Na de bloedafname krijgt u een ontbijt aangeboden.

### Waar moet u op letten als u weer naar huis gaat?

- De Metyrapon kan als bijwerking wat maag/darm klachten veroorzaken. Dit trekt vanzelf snel weer weg.

### Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt bij het verlaten van de afdeling een poliklinische afspraak mee bij uw eigen internist. Deze afspraak zal na circa 2 tot 3 weken zijn

### Vragen

Heeft u voor, tijdens of na afloop van het onderzoek vragen, stelt u deze dan gerust aan uw specialist of degene die het onderzoek uitvoert. Het is verstandig om uw eventuele vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

1. \_\_\_\_\_ ?
2. \_\_\_\_\_ ?
3. \_\_\_\_\_ ?
4. \_\_\_\_\_ ?
5. \_\_\_\_\_ ?
6. \_\_\_\_\_ ?

### Praktische informatie

*Wanneer moet u waar zijn voor uw onderzoek?*

U heeft een afspraak op: \_\_\_\_\_ (dag) \_\_\_\_\_ (datum) om \_\_\_\_\_ uur.

U meldt zich dan op:

Maatweg 3

3813 TZ Amersfoort

### Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis of u heeft vragen?

Als uw klachten aanhouden of u heeft nog vragen, dan kunt bellen naar het algemene nummer van Meander Medisch Centrum, telefoon: 033 – 850 5050 en vragen naar de afdeling waar u opgenomen bent geweest.