

## Clonidinetest

*Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Moeder Kind van Meander Medisch Centrum. In deze folder informeren wij u en uw kind over de Clonidinetest. Waarom is deze test nodig? Wat gebeurt er tijdens de test? Hoe lang duurt de test? Wanneer krijgt u de uitslag van de test? We geven u en uw kind informatie over de eventuele voorbereiding thuis en hoe u contact kunt opnemen met de afdeling waar de test plaatsvindt.*

### Wat is een Clonidinetest?

Een Clonidinetest is een test om te bepalen of er voldoende groeihormoon in het lichaam worden aangemaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. Door de werking van het groeihormoon groeit uw kind. Clonidine zet de hypofyse aan tot het afgeven van dit hormoon.

### Vorbereidingen

- Voorafgaande aan de test mag uw kind vanaf 02.00 uur 's nachts niets meer eten en/of drinken (= nuchter), omdat de spijsvertering de hoeveelheid groeihormoon in het bloed kan beïnvloeden.
- Als uw kind medicijnen gebruikt, laat hem/haar deze op de normale tijd innemen met een klein slokje water, tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
- U en uw kind melden zich op \_\_\_\_\_ dag, \_\_\_\_\_ om \_\_\_\_\_ uur op de afdeling Kinderdagverpleging.
- Als voorbereiding op het inbrengen van het infuus, wordt er bij uw kind op beide elleboogholtes een verdovende pleister aangebracht, waardoor uw kind minder pijn ervaart bij het inbrengen van het infuusnaaldje.
- De pedagogisch medewerker bereidt u en uw kind voor op wat er gaat gebeuren met behulp van een fotoboek en beeldvormend materiaal.

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen, indien uw kind voorafgaand aan deze test:

- ziek is geworden, koorts heeft (boven 38.0 graden Celcius);
- in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte;
- op een veehouderij woont;
- in de laatste 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis is geweest voor behandeling;
- contact heeft gehad met dragers van de MRSA- bacterie.
  - Dit kan betekenen dat de test verzet moet worden.
- Broertjes en zusjes kunnen niet mee.
- Makkelijk zittende kleding en geen strakke mouwen is voor uw kind het prettigst in verband met het infuus in de arm.
- Neem iets vertrouwd mee zoals een knuffel of speen.
- Neem eventueel voor uzelf iets te eten mee.

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)  
[mijnmeander.nl](http://mijnmeander.nl)

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten  
(Gezondheidscentrum Scala Medica)  
Chopinstraat 2D  
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

**Postadres:**  
Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

**Telefoonnummers:**  
Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

**KvK Gooi en Eemland:**  
32082917

## De test

- De verpleegkundige verwijdert de pleister uit de elleboogholtes of hand van uw kind.
- Een kinderarts brengt het infuusnaaldje in de ader van de arm. Dit gebeurt op de onderzoektafel in een behandelkamer van de afdeling (dit is te vergelijken met de bloedafname op het laboratorium).
- Bij het inbrengen van het infuusnaaldje wordt er bloed afgenomen voor onderzoek.
- Gedurende de hele test blijft het infuus in de arm zitten. Het infuus wordt vastgezet met een spalkje en verbandje, om te voorkomen dat het naaldje voortijdig uit het bloedvat gaat.
- Uw kind verblijft de hele test op bed. Uw kind mag op bed spelen.
- Uw kind krijgt een paar kleine pilletjes te slikken, dit is de clonidine.
- Dit medicijn heeft als bijwerking dat uw kind erg slaperig wordt en dat de bloeddruk daalt.
- De bloeddruk wordt ieder half uur gemeten.
- De verpleegkundige neemt gedurende de hele test op afgesproken tijden bloed af. Dit wordt via een 'kraantje' aan het infuus gedaan en uw kind zal daar geen pijn aan hebben.
- In totaal wordt er 6 keer bloed afgenomen.
- Na de laatste bloedafname is de test afgelopen. Nu mag uw kind weer eten en drinken.
- Als de bloeddruk van uw kind weer normaal is, zal het infuus met spalkje en verband worden verwijderd. Er wordt een pleister op het insteekgaatje geplakt; dit is niet pijnlijk.
- De opname duurt ongeveer 6 uur.

## Na de test

- Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig.
- Sommige kinderen kunnen wat hoofdpijn krijgen of worden misselijk.
- Het tijdens de test toegediende medicijn wordt uit geplast. Hier merkt uw kind niets van.
- De pleister van het infuus kunt u bij thuiskomst verwijderen.
- Met de kinderarts heeft u een (telefonische) afspraak voor de uitslag van de test.

## Contact

- Tot één week na het onderzoek belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
  - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
  - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.