

## Infliximab

*Uw specialist heeft u Infliximab voorgeschreven voor de behandeling van uw aandoening. Voordat de behandeling van start gaat, is het van belang dat u er een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.*

### Het effect van Infliximab

Met medicijnen is de oorzaak van uw aandoening niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die de symptomen van deze aandoening af kunnen zwakken. Infliximab is zo'n medicijn. Infliximab kan helpen om de ontsteking te verminderen en de schade te beperken.

Infliximab is sinds juni 2000 beschikbaar in Nederland. Het is een medicijn dat het toekomstbeeld van patiënten met bepaalde aandoeningen aanmerkelijk kan verbeteren. Infliximab blijkt bij veel van de tot nu toe behandelde patiënten een zeer effectief medicijn te zijn.

### Wijze van toediening

De toediening van Infliximab vindt altijd plaats onder controle van uw specialist. Infliximab wordt toegediend via een infuus in het ziekenhuis. Deze manier van medicijnen toedienen wordt 'infusie' genoemd. Bij de eerste infusie verblijft u één dag in het ziekenhuis om te zien hoe het u vergaat. De volgende toedieningen krijgt u tijdens een opname van een halve dag op de Meervoudige dagbehandeling.

### Reumatische aandoening

De eerste 3 behandelingen vinden binnen 6 weken plaats. Op tijdstip 0 is de eerste behandeling, de volgende behandeling is na 2 weken en de derde keer is dan na 4 weken. Daarna kan worden volstaan met een infusie om de 6 of 8 weken, afhankelijk van uw reumatische aandoening. Als blijkt dat de Infliximab goed aanslaat, kan het voor onbepaalde tijd gegeven worden.

### Interne aandoening

Het infusieschema voor interne aandoeningen wordt gemaakt door uw behandelend internist. De hoeveelheid Infliximab die u krijgt toegediend, wordt door de specialist berekend op basis van uw lichaamsgewicht.

Als onderdeel van de behandeling met Infliximab, krijgt u meestal een lage dosis Methotrexaat voorgeschreven. Dit krijgt u omdat uit studies is gebleken dat deze medicatie de werking van Infliximab versterkt.

### Mogelijke bijwerkingen

Praktisch alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Dit geldt ook voor Infliximab. Vaak kunnen deze bijwerkingen worden opgespoord voordat zij ernstige problemen geven.

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)  
[mijn.meandermc.nl](http://mijn.meandermc.nl)

#### Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten  
(Gezondheidscentrum Scala Medica)  
Chopinstraat 2D  
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

#### Postadres:

Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

#### Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

#### KvK Gooi en Eemland:

32082917

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- huidreacties, waaronder netelroos
- vermoeidheid
- moeilijk ademen
- lage bloeddruk
- koorts
- duizeligheid
- misselijkheid
- diarree

De symptomen zullen relatief vaker optreden bij de eerste of tweede toediening. Als dit gebeurt kan uw specialist besluiten tijdens de toediening de snelheid van het infuus te verminderen.

Een andere mogelijkheid is het tijdelijk stoppen van de Infliximab totdat de symptomen verdwenen zijn en daarna opnieuw beginnen. De meeste bijwerkingen tijdens de behandeling zijn mild tot matig en zijn goed te behandelen. Bijwerkingen kunnen optreden tot 6 maanden na de laatste infusie. Indien u één van deze bijwerkingen krijgt, meld dit direct aan uw specialist of huisarts.

## Voorzorgsmaatregelen

### Tuberculose

Voordat u start met Infliximab wordt onderzocht of u ooit in contact bent geweest met tuberculose (tbc). Een inactieve tbc kan met Infliximab weer actief worden. Omdat Infliximab effect heeft op uw immuunsysteem is het belangrijk dat u alert bent op (dreigende) infecties.

### Infectie

Indien u een infectie heeft, schrijft uw huisarts een antibioticum voor. Het is dan meestal zo dat de toediening van Infliximab wordt uitgesteld. Als u een infectie heeft en een afspraak voor een Infliximab toediening, belt u dan met de specialist om te overleggen.

### Operatie

Als u een operatie moet ondergaan, stelt u dan de verpleegkundige op de Meervoudige dagbehandeling hiervan op de hoogte. Hierbij geldt ook weer dat de Infliximab toediening uitgesteld moet worden en pas hervat mag worden als de wond goed genezen is. Plan de operatie bij voorkeur 6 weken na de laatste Infliximab toediening.

Bij twijfel is het belangrijk dat u contact opneemt met de verpleegkundige van de Meervoudige dagbehandeling of uw behandelend specialist.

## Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u Infliximab met bijna alle andere geneesmiddelen samen gebruiken. Houd uw specialist en huisarts wel op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.

## Het gebruik samen met vaccinaties

U kunt uw griepvaccinatie gewoon krijgen als u Infliximab krijgt toegediend. Raadpleeg bij andere vaccinaties altijd uw specialist.

## Reizen

Als u van verre reizen houdt en denkt dit in de toekomst te gaan ondernemen, kunt u zich het beste nu al laten inenten. Voor de gele koorts inenting, die overigens niet vaak verplicht wordt gesteld, geldt zelfs dat deze moet geschieden voordat u aan dit medicijn begint. Informeer hiervoor bij de plaatselijke GGD.

---

## Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Voor zover nu bekend is, heeft Infliximab geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Dit hangt onder andere af van de activiteit van de ziekte. Tijdens de zwangerschap (tot 20 weken) kan Infliximab veilig gebruikt worden. Daarna wordt geadviseerd om te switchen naar Etanercept of Certolizumab pegol.

## Controle

Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist periodiek uw bloed onderzoeken. De uitslag hiervan is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen voor de uitslag. Uw specialist neemt contact met u op indien de uitslag afwijkend is. Gebeurt dit niet, dan kunt u er vanuit gaan dat uw bloed in orde is.

## Belangrijke informatie

- Houd uw specialist en huisarts in ieder geval op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.
- Hiervoor kunt u eventueel een geneesmiddelenpaspoort gebruiken. Dit is verkrijgbaar in de apotheek.
- Alcohol heeft geen ongunstige invloed op de werking van Infliximab. U mag dus met mate alcohol nuttigen.

## Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend specialist. Uw specialist is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50 (vraagt u naar de polikliniek van uw behandelend specialist).