

## Nabehandeling lipsluiting

### Kinderafdeling

*Uw kind heeft een correctie van zijn/haar lipschisis gekregen. In deze folder geven wij u wat extra informatie over de nabehandeling.*

### Hoe lang moet uw kind in het ziekenhuis blijven na de operatie?

Het verblijf in het ziekenhuis is gemiddeld twee tot vijf dagen. Bij kinderen bij wie alleen de lip gesloten is, is het verblijf korter. Bij kinderen waar een stukje van het harde gehemelte gesloten is, zal dit langer zijn. Het ontslag hangt af van de voedings- en algemene gezondheidstoestand van uw kind. De beslissing over het ontslag wordt door de kinderarts en plastisch chirurg genomen.

### Wat mag uw kind drinken na de operatie?

Kinderen bij wie alleen een lipsluiting gedaan is, kunnen direct na de operatie dezelfde voeding zoals voor de operatie hervatten. Bij kinderen bij wie een stukje van het harde (voorste) gehemelte ook gesloten is, mogen op de dag van de operatie alleen wat water drinken. De eerste dag na de operatie mogen de kinderen weer gewoon melk drinken (meestal middels een Habermann-speen).

### Wanneer mag u weer borstvoeding geven na de operatie?

Als u borstvoeding gaf voor de operatie, mag u dat bij alleen een lipsluiting direct na de operatie ook geven. Kinderen die een lip-/kaak-/gehemelteschisis hebben, hebben voor de operatie geen borstvoeding kunnen krijgen en dat zal na deze operatie ook niet kunnen.

### Heeft uw kind pijn van de operatie?

Kinderen met alleen een lipschisis hebben meestal niet veel pijn. Bij kinderen met een lip-/kaak-/gehemelteschisis bij wie we ook tijdens de lipsluiting het voorste deel van de gehemelte sluiten, kunnen lichte pijn voelen. Er is vaak een wondje in het gehemelte dat vanzelf zal genezen binnen een week of twee. Het operatiegebied en de wondjes kunnen gevoelig zijn voor uw kind. Wij geven soms even na de operatie morfine. Meestal kunnen we vrij snel over gaan op de Paracetamol en eventueel een iets sterkere pijnstilling, zoals Diclofenac.

### Wat voor pijnmedicatie mag u thuis geven?

Voor de eerste vijf tot zeven dagen na de operatie is voor pijnbestrijding paracetamol meestal voldoende. Maar soms moet u daar Diclofenac bij geven. Wij adviseren geen aspirine te gebruiken. De hoeveelheid pijnmedicatie is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Wij adviseren u dertig minuten voor de voeding paracetamol te geven.

### Hoe weet u of uw kind genoeg drinkt?

De eerste dag(en) in het ziekenhuis heeft uw kind een infuus. Via dat infuus dienen wij extra vocht toe. U mag uw kind stimuleren met de voeding, maar u hoeft hem/haar niet te dwingen te eten. Het duurt vaak een dag of twee voor de voeding op gang komt. Als u thuis bent en uw kind heeft genoeg natte luiers, dan krijgt hij/zij genoeg vocht binnen.

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)  
[www.mijnmeandermc.nl](http://www.mijnmeandermc.nl)

#### Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten  
(Gezondheidscentrum Scala  
Medica)  
Chopinstraat 2D  
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

#### Postadres:

Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

#### Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

#### KvK Gooi en Eemland:

32082917

---

### **Mag uw kind een fopspeen direct na de operatie?**

Uw kind mag een fopspeen na de operatie. In de gevallen waarbij wij vooral het voorste gedeelte van het harde gehemelte gesloten hebben, zal het zuigen (Habermann of fopspeen) de eerste dagen gevoelig zijn.

### **Zal uw kind meer 'hongerig' zijn na de operatie?**

Behalve de gevoeligheid na de operatie moet uw kind er ook wennen dat zijn/haar lip gesloten is. Dit 'trauma' uit zich vaak doordat uw kind de eerste nachten minder goed slaapt en vaker wakker kan zijn. Tevens kan hij/zij meer afhankelijk van de ouders en zich 'hongerig' gedragen. Binnen een paar weken is dat meestal weer zoals voor de operatie.

### **Mag uw kind zijn/haar vinger in zijn/haar mond doen na de operatie?**

Laat uw kind liever geen vingers of duim in de mond doen. Soms moeten we tot een dag of twee na de operatie de handen van uw kind met een washandje of sokje bedekken om te voorkomen dat hij/zij zijn/haar vingers/duim in zijn/haar mond stopt.

### **Als u in de mond kijkt, wat ziet u dan?**

Bij kinderen bij wie het voorste deel van het gehemelte gesloten is kunnen er tijdens het huilen/gapen oplosbare hechtingen zichtbaar zijn. Tevens kan er in het midden een 'wondje' te zien zijn. Dit kan 'donker' lijken. Dit is geen afgestorven weefsel, maar de plaats waar wij de wond open gelaten hebben. Binnen één tot twee weken zijn deze wondjes genezen.

### **Kan er bloed uit de mond komen na de operatie?**

Na de operatie kan er bloed uit de neus en mond komen. Dit is meestal voor een dag of twee en is aanwezig omdat er soms wat gebieden zijn die de plastische chirurg opengelaten heeft om vanzelf te genezen.

### **Kan uw kind misselijk zijn na de operatie?**

Soms kunnen de wonden wat nabloeden en het kan gebeuren dat uw kind dit bloed inslikt. Bloed in de maag kan uw kind misselijk maken en hem/haar laten braken. Dit is meestal alleen de eerste 24 uur na de operatie het geval. Indien nodig geven wij uw kind iets tegen de misselijkheid.

### **Mag uw kind huilen na de operatie?**

Ja, dat mag. Wel kan de lipwond losscheuren als uw kind te druk is.

### **Moeten de hechtingen van de wond verwijderd worden?**

Nee. Wij gebruiken in principe oplosbare hechtingen of wondlijm. Vaak plaatsen wij ook nog een pleister over de wond. Deze moet u gedurende zeven dagen laten zitten.

### **Mag u de wond masseren?**

Zeven dagen na de operatie mag u het lip-litteken voorzichtig gaan masseren. Het maakt niet zo veel uit of u daar een littekencrème of een lotion (bijvoorbeeld vaseline of Nivea) voor gebruikt. Uw kind zal het niet als prettig ervaren, maar we denken dat het litteken sneller uitrijpt hierdoor. U hoeft niet meer dan één tot twee keer per dag te masseren, gedurende één tot twee minuten. Het is niet nodig dit langer dan drie maanden te doen.

---

## Mag uw kind in bad na de operatie?

Wij willen niet dat de wond de eerste week na de operatie nat wordt. Daarna mogen alle pleisters van de wond en mag de wond nat worden.

## Wanneer moet uw kind terugkomen na de operatie?

Wij willen uw kind vier tot zes weken na de operatie terug zien op de polikliniek. Bij problemen eerder.

## Wie moet u bellen als er problemen zijn na de operatie?

Als de voeding van uw kind achteruit gaat, als de temperatuur van uw baby boven de 38,5 graden Celsius stijgt, vragen wij u ook contact met ons op te nemen.

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse opname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
  - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
  - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Voor dringende zaken tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met onze Schisisteam-coördinator WKZ, Eeke Jeehe, telefoon 088 - 755 55 55, u kunt vragen naar pieper 5246.

In zeer dringende gevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Plastische Chirurgie (ook in het weekend) door het algemene nummer van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te bellen, telefoon 088 - 755 55 55.