

Bloedtransfusie

In deze folder vindt u informatie over de bloedtransfusie. Mogelijk heeft u ten gevolge van uw behandeling een bloedtransfusie nodig. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Redenen voor een bloedtransfusie

Ieder jaar ontvangen zo'n 250.000 mensen in Nederland een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie kan nodig zijn bij mensen die overmatig bloedverlies hebben. Daarnaast kunnen patiënten die een (grote) operatie ondergaan een bloedtransfusie nodig hebben. Ook kan een bloedtransfusie nodig zijn bij patiënten die behandeld worden voor kanker of een (kwaadaardige) bloedziekte.

Uw arts informeert u vooraf over:

- de reden van de bloedtransfusie;
- de risico's die aan de bloedtransfusie verbonden zijn;
- de risico's die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie;
- alternatieven voor de bloedtransfusie.

De veiligheid van een bloedtransfusie

Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen:

- alleen gezonde mensen kunnen bloeddonor worden;
- bloeddonors geven hun bloed vrijwillig en onbetaald;
- al het donorbloed wordt getest op een aantal geelzuchtvirussen (hepatitis B en C), syfilis, en het Hiv-virus.

Mogelijk besmet bloed wordt vernietigd. Ondanks alle voorzorgmaatregelen blijft er een zeer kleine kans bestaan op besmetting met een virus of ziektekiem door de bloedtransfusie. Het kan zijn dat de bloeddonor nog maar kort geleden werd besmet. In dit bloed kan de aanwezigheid van de ziekteverwekker dan nog niet worden aangetoond. Ook is het mogelijk dat de hoeveelheid virus in het bloed zo gering is, dat het niet kan worden aangetoond met een bloedtest. Tevens kan het gebeuren dat er virussen in het bloed zitten die we nog niet kennen of waarop niet getest wordt.

Juiste match

Het is belangrijk dat het bloed dat u toegediend krijgt bij u 'past'. Passend bloed is afhankelijk van de bloedgroep, de resusfactor en van de afweerstoffen. Daarom nemen wij vooraf bloed bij u af om uw bloedgroep en uw resusfactor te bepalen. Sommige mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze stoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap of na een vroegere bloedtransfusie. Het transfusielaboratorium zoekt passend bloed voor u. Na controle op het laboratorium zal de verpleegkundige samen met een collega nogmaals controleren of het bloedproduct inderdaad voor u bestemd is.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Bijwerkingen van de bloedtransfusie

Hoewel de risico's van een bloedtransfusie tot een minimum worden beperkt, kunnen deze niet helemaal worden uitgesloten. Tijdens of na een bloedtransfusie kan een allergische reactie optreden. Zo'n reactie is te herkennen aan koorts, rillingen, galbulten, jeuk of een rode huid. Dit kan vaak eenvoudig met medicijnen worden behandeld. Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie afweerstoffen tegen andermans bloedcellen of tegen bloedcellen van een bepaalde bloedgroep. Ook dit kan een reactie geven in de vorm van koorts. Dit kan met medicijnen worden behandeld.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat deze afweerstoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze afweerstoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het transfusielaboratorium van het ziekenhuis, het landelijk datasysteem raadplegen en op deze manier passend bloed voor u uitzoeken.

Weigeren van een bloedtransfusie

U kunt een bloedtransfusie weigeren. Bedenkt u daarbij wel dat er niet veel andere mogelijkheden zijn. Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie weigeren betekent soms een groter risico voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen. Bespreek uw twijfels over de bloedtransfusie tijdig met uw behandelend arts.

Als u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens in het landelijk datasysteem, kunt u dit bij uw arts aangeven. Het ziekenhuis zal uw bezwaar in uw dossier vastleggen.

Een transfusie van uw eigen bloed

Bij sommige operaties verliezen patiënten veel bloed. In plaats van bloed weg te laten vloeien tijdens de operatie, kan het ook opgevangen worden via een zuigdrainage systeem. In het reservoir worden stoffen die nadelig kunnen zijn voor de patiënt eruit gefilterd. Het bloed wordt geschikt gemaakt om terug te geven aan de patiënt. U kunt met uw behandelend arts of anesthesioloog overleggen of u in aanmerking komt voor deze methode.

Meer weten?

In deze folder heeft u uitleg gekregen over de bloedtransfusie. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met uw behandelend arts bespreken. Ook vindt u op de website van Sanquin de nodige informatie, www.sanquin.nl.

Contact

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse** opname geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een behandeling in **dagopname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.