

## Salazopyrine

*Uw specialist heeft u Salazopyrine voorgeschreven voor de behandeling van uw aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het van belang dat u er een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.*

### Het effect van Salazopyrine

Met medicijnen is de oorzaak van uw aandoening niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die de symptomen van uw aandoening kunnen verminderen en kunnen stopzetten. Salazopyrine is zo'n medicijn. Na enige tijd kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Ook is aangetoond dat er bij gebruik van dit middel op de lange termijn minder schade aan bot en kraakbeen ontstaat. Het kan echter wel 2 tot 3 maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken.

Indien Salazopyrine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang gebruiken. Helaas is dit niet bij iedereen het geval. Als blijkt dat Salazopyrine niet werkt of u heeft te veel last van bijwerkingen, kan de specialist besluiten het gebruik van Salazopyrine stop te zetten.

### Wijze van toediening

Salazopyrine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg en wordt meestal volgens een opbouwschema ingenomen.

#### Opbouwschema:

	Ochtend	Middag	Avond
Week 1:	0 tabl.	0 tabl.	1 tabl.
Week 2:	1 tabl.	0 tabl.	1 tabl.
Week 3:	1 tabl.	0 tabl.	2 tabl.
Week 4:	2 tabl.	0 tabl.	2 tabl.

#### Daarna eventueel op voorschrift van uw specialist:

Ochtend	Middag	Avond
2 tabl.	2 tabl.	2 tabl.
3 tabl.	0 tabl.	3 tabl.

De specialist bepaalt uw dosis en schema.

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel en/of water. Het is belangrijk dat u ze niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Als u vergeten bent de tabletten in te nemen, neemt u ze dan zo spoedig mogelijk nog dezelfde dag in.

### Mogelijke bijwerkingen

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Ook Salazopyrine heeft bijwerkingen. Als u last heeft van bijwerkingen, meldt dit dan zo snel mogelijk aan uw specialist.

#### Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

#### Postadres:

Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

#### Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

#### KvK Gooi en Eemland:

32082917

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)

Mogelijke bijwerkingen:

- misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, soms duifheid (vooral in het begin, dit gaat meestal over)
- huiduitslag
- pijnlijke plekjes en/of zweertjes in de mond
- keelpijn in combinatie met koorts
- herhaaldelijk een bloedneus
- een verandering in uw stemming
- de urine kan een oranje kleur krijgen (onschuldig, dit gaat over indien de tabletten niet meer geslikt worden)

### **Het gebruik samen met andere geneesmiddelen**

Over het algemeen kunt u Salazopyrine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken. Er zijn echter enkele medicijnen, zoals sommige antibiotica en ijzertabletten, die de werking van Salazopyrine beïnvloeden. Ook kan Salazopyrine de werking van bloedverdunders (zoals Sintrom(mitis) en Marcoumar) beïnvloeden. Dit geldt ook voor de combinatie van Salazopyrine met Digoxine (harttabletten) en tabletten bij suikerziekte. Houdt daarom uw arts op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.

### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Voor zover bekend heeft Salazopyrine geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Bij mannen kan het echter een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer enkele maanden nadat het middel niet meer gebruikt wordt. Tijdens de zwangerschap kan Salazopyrine alleen in overleg met uw specialist gebruikt worden. Ditzelfde geldt voor als u borstvoeding geeft.

### **Controle**

Om eventuele stoornissen/bijwerkingen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed te ontdekken, laat uw specialist regelmatig bloed en soms urine controleren. Dit gebeurt de eerste periode meestal om de 3 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag van de controle is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen voor de uitslag. Uw specialist neemt contact met u op indien de uitslag van het bloedonderzoek afwijkend is. Gebeurt dit niet, dan kunt u er vanuit gaan dat uw bloed en/of urine in orde is. U kunt de tabletten innemen zoals met u is afgesproken.

### **Aanvullende informatie**

Waarschuwt u uw specialist bij aanhoudende koorts en keelklachten of bij langdurige griepverschijnselen.

### **Contact**

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw arts. Persoonlijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw specialist aan u verteld worden. Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw specialist. Dat kan via het afsprakennummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 60 70.