

## Merknaam

RoActemra®

## Afleveringsvorm

RoActemra, 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Elke 4 ml flacon bevat 80 mg tocilizumab (20 mg/ml)

Elke 10 ml flacon bevat 200 mg tocilizumab (20 mg/ml)

Elke 20 ml flacon bevat 400 mg tocilizumab (20 mg/ml)

## Farmaco Therapeutische Groep

DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug)

## Oplosmiddel

Niet van toepassing

## Bereiden

- Bepaal aan de hand van de dosering het aantal benodigde flacons
- Verwijder uit een infuuszak NaCl 0,9% van 100 ml het volume dat vervolgens als tocilizumaboplossing moet worden toegediend (dus 4 ml, 10 ml of 20 ml of combinaties hiervan, zie onderstaande tabel bij "Dosering")
- Voeg de tocilizumaboplossing langzaam toe aan de infuuszak
- Meng voorzichtig om schuimen te voorkomen

## Toedieningsroute

- Intraveneuze infusie, inloopsnelheid: 1 uur

## Bevoegdheden

- I.V. infusie: verpleegkundige

## Dosering

- In het algemeen: volwassenen 8 mg/kg (=0,4 ml/kg) lichaamsgewicht elke 4 weken, echter niet minder dan 480 mg per keer

Gewicht (kg)	Dosering (mg)	Aantal ml verwijderen uit 100 ml NaCl 0,9%	Te gebruiken flacons Tocilizumab 20 mg/ml
--------------	---------------	--	---

Tot 65 kg	480	24	20 ml + 4 ml
66-72 kg	560	28	20 ml + 2 x 4 ml
73-80 kg	600	30	20 ml + 10 ml
81-90 kg	680	34	20 ml + 10 ml + 4 ml
91-97 kg	760	38	20 ml + 10 ml + 2x 4 ml
98-105 kg	800	40	2 x 20 ml
106-115 kg	880	44	2 x 20 ml + 4 ml
116-122 kg	960	48	2 x 20 ml + 2 x 4 ml
123-130 kg	1000	50	2 x 20 ml + 10 ml
131-140 kg	1080	54	2 x 20 ml + 10 ml + 4 ml
140-147 kg	1160	58	2 x 20 ml + 10 ml + 2x4 ml

## Houdbaarheid

Na verdunnen: 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

## Verenigbaar met

Geen verenigbaarheden bekend

## Onverenigbaar met

Alle (andere) geneesmiddelen niet genoemd bij verenigbaar met

## Bijzonderheden

- Noodset voor anafylactische shock klaarleggen. Aanwezig moet zijn: clemastine (Tavegil), prednisolon en epinefrine
- De oplossing is een heldere tot bijna doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing. Indien dit niet het geval is, de flacons niet gebruiken.

## Acute reacties

Infusiereacties kunnen optreden: anafylactische reacties, hypertensie, hoofdpijn, huiduitslag en urticaria

## Bijwerkingen

Infecties van de bovenste luchtwegen, cellulitis, herpesinfectie, ulceratie in de mond, gastritis, jeuk, huiduitslag, duizeligheid, hoofdpijn, stijging van ALAT en ASAT, hypertensie, leukopenie,

netropenie, hypercholesterolemie en conjunctivitis

## **Bronvermelding**

SPC Tocilizumab, 16 januari 2009