

EBUS-onderzoek

Binnenkort zult u een onderzoek van de lymfeklieren in de borstkas ondergaan. In deze folder wordt nadere uitleg over het onderzoek gegeven. Bovendien wordt verteld welke voorbereidingen noodzakelijk zijn.

Omdat dit onderzoek ongemak met zich mee kan brengen krijgt u via een infuusnaaldje een slaap/kalmeringsmiddel toegediend. Het slaap/kalmeringsmiddel kan uw reactievermogen verminderen, waardoor het onverantwoord is om het ziekenhuis alleen te verlaten. Regelt u daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. Wij adviseren u om (de rest van de dag) geen activiteiten te ondernemen waarbij een beroep wordt gedaan op uw reactievermogen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het EBUS-onderzoek is om met behulp van echografie vanuit de luchtpijp weefsel te verkrijgen van klieren die zich tussen uw longen bevinden. Het celmateriaal dat met behulp van een dunne naald verkregen wordt, zal onder een microscoop gelegd worden om een diagnose te stellen of, wanneer er al een diagnose is, te beoordelen in hoeverre de ziekte is uitgebreid.

Risico's en complicaties

Het gebruik van slaap/kalmeringsmiddelen gaat gepaard met een klein risico. Om dit risico te beperken, worden uw ademhaling en hartslag tijdens het onderzoek en daarna zorgvuldig gecontroleerd. U kunt na het onderzoek wat bloed bij het slijm ophoesten. Heeft u andere klachten, laat dit dan weten.

Vorbereiding op het onderzoek

- De ochtend van het onderzoek kunt u nog een licht ontbijtje gebruiken: een kopje thee en een beschuitje. Daarna moet u nuchter blijven.
- Wanneer u bloedverdünnende middelen gebruikt, is het van belang dat u dit vertelt aan uw behandelend arts.
- Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
- U mag een eventuele gebitsprothese niet inhouden tijdens het onderzoek.

Wanneer de EBUS poliklinisch plaatsvindt, wordt u eerst een half uur voorafgaande aan het onderzoek opgenomen op een afdeling. Hier worden eventuele vragen of onduidelijkheden met u besproken. De verpleegkundige zal een infuusnaaldje in uw arm aanbrengen. Dit is alvast voor het slaap/kalmeringsmiddel dat u voor het onderzoek toegediend krijgt.

Het onderzoek

Voorafgaande aan het onderzoek zal de longarts u uitleg geven waarom dit onderzoek zinvol is en hoe dit zal plaatsvinden.

Met behulp van een spray verdooft de arts of verpleegkundige uw keel en mond. Dit is nodig om de reflex tot kokhalzen weg te nemen. De verdovingspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Ook wordt in de

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

luchtwegen nog een verdovingsvloeistof gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt. Via het infuus krijgt u een slaap/kalmeringsmiddel. U voelt zich wat slaperig en u zult van het onderzoek naar verwachting weinig merken.

Aan het begin van het onderzoek zal de arts de scoop via de mond in de luchtpijp brengen. Direct na het inbrengen kunt u de prikkeling voelen van de luchtpijp waardoor u kunt hoesten. De arts zal dit direct extra verdoven met verdovingsdruppels, zodat u gedurende het onderzoek hier zo weinig mogelijk last van ondervindt.

Nadat de echo-endoscoop zich in de luchtpijp bevindt, zal de arts met behulp van echobeelden de tussen de longen gelegen lymfeklieren gaan onderzoeken. Zo nu en dan zal de longarts weefsel met een dunne naald opzuigen. Hier voelt u echter niets van. Tijdens het onderzoek houden wij uw lichaamsfuncties als hartslag en zuurstofgehalte in het bloed goed in de gaten.

Het onderzoek neemt gemiddeld 30 minuten in beslag. Het weefsel wordt na het onderzoek onderzocht onder de microscoop en een week na het onderzoek krijgt u telefonisch of poliklinisch bericht over de uitslag.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u 2 uur niets eten of drinken. Dit omdat uw keel verdoofd is voor het onderzoek en u zich zou kunnen verslikken. Na het onderzoek slaapt u nog een uurtje uit op afdeling waar u was opgenomen. Als u goed wakker bent mag u, in overleg met de longarts, naar huis. Neemt u, 2 uur na het onderzoek, eerst een slokje water. Gaat dit goed, dan kunt u weer normaal eten en drinken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt.
- Iets om te lezen of te puzzelen of MP3-speler voor als u voor het onderzoek moet wachten op de afdeling Endoscopie.
- Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is.
- Heeft u diabetes en gebruikt u insuline? Neem dan ook uw insulinepen(nen) en bloedsuikermeter mee.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de endoscopie-afdeling via telefoonnummer: 033- 8505050. Of stel deze voor het onderzoek aan de verpleegkundige op de afdeling.