

Besnijdenis (circumcisie)

In overleg met uw arts zal er bij u een besnijdenis (circumcisie) worden gedaan.

Bij een besnijdenis wordt een gedeelte of de hele voorhuid van de penis door middel van een operatie verwijderd.

De meest voorkomende reden is een te nauwe voorhuid.

Het gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens de erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Ook schrijven bepaalde godsdiensten besnijdenis van jongens voor. Daarnaast zijn er ouders die bij hun zoon een besnijdenis wensen uit hygiënische overwegingen.

Vorbereiding

Bij kinderen gebeurt de ingreep onder narcose.

Uw zoon mag dan voor de ingreep niets eten of drinken (moet 'nuchter' zijn).

Bij volwassenen wordt de ingreep meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving gedaan. Soms wordt u verzocht tevoren thuis de haren rondom de penis te scheren.

Afgeraden wordt om na de ingreep zelf een auto te besturen; geadviseerd wordt om voor vervoer naar huis zorg te dragen.

Vertel aan uw arts als u bloedverdunnende middelen gebruikt.

In overleg worden deze dan voor de ingreep misschien gestopt.

De operatie

Bij plaatselijke verdoving wordt de penis verdoofd door één of twee injecties aan de onderkant van de penis. Na de plaatselijke verdoving of volledige narcose wordt de penis gedesinfecteerd.

Hierna wordt de omgeving met steriele doeken afgedekt. Bij de operatie wordt de voorhuid verwijderd en worden er rondom de penis oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de eikel. Deze hechtingen lossen meestal na ongeveer veertien dagen op en hoeven dus niet verwijderd te worden. Vóór de ingreep zijn er vaak verklevingen aanwezig tussen voorhuid en eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt en hierdoor ziet de eikel er enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huid.

Na de operatie wordt de penis verbonden, vaak met een vettig gaas of zalf en steriele gazen. De hele ingreep duurt ongeveer twintig minuten.

Na de besnijdenis is de eikel meestal onbedekt. Dit kan vooral de eerste dagen gevoelig zijn.

Nazorg thuis

Kinderen

Als uw kind is opgenomen op de afdeling Dagverpleging kan hij dezelfde dag nog naar huis, meestal nadat hij geplast heeft.

De volgende dag mag uw kind weer douchen en kan zijn gang weer gaan. De wond moet u zoveel mogelijk schoon en droog houden. Gedurende de eerste dagen na de operatie wordt geadviseerd na het plassen het verband te wisselen. Om de penis te ondersteunen en de wond rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts). Na douchen of baden is het verstandig de wond droog te deppen.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

Er zijn verder geen beperkingen. Bij pijn mag u uw zoontje drie- tot viermaal daags een kinderparacetamol tablet of zetpil (125-250 mg, afhankelijk van het gewicht van uw kind, zie bijsluiter) geven. Het is wel verstandig de eerste week niet uitgebreid in bad te gaan of te zwemmen.

Volwassenen

Na de ingreep is het verstandig de rest van de dag rustig aan te doen. U kunt enkele dagen een branderig gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u paracetamol tabletten nemen.

Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit meestal weer. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die kunnen gaan schrijnen. Dit gaat vanzelf weer over. Een dag na de ingreep mag u weer douchen. Om de penis te ondersteunen en de wond rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts).

U wordt aangeraden een week niet te zwemmen.
Zes weken mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.

Complicaties

Eventuele mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd uitsluitend tot de wond. Er kan een nabloeding ontstaan. U kunt dit zien aan een bloederig verband of een bloeditstorting onder een hechting. Soms kan er een ontsteking ontstaan.

Indien de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of als u koorts krijgt boven 38,5 ° Celsius, moet u contact opnemen met uw uroloog.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek bij de polikliniekassistente.
Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u worden verteld. Indien er bijzonderheden zijn, waar u zich zorgen over maakt of als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op.

U kunt alle vragen gerust stellen aan uw behandelend arts.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Maandag t/m vrijdag: van 08.00 - 16.30 uur.

De polikliniek is bereikbaar via het afsprakennummer 033 - 850 60 70 (vragen naar de polikliniek Urologie).