

Operatie vernauwde grote buikslagader/bekkenlagader

In deze folder vindt u informatie over de operatie aan vernauwingen of afsluitingen van de grote buikslagader en/of de bekkenlagader. In medische termen heet de operatie aortobifemorale bypass. U krijgt hier algemene informatie.


Houdt u er rekening mee dat ieders persoonlijke situatie natuurlijk kan verschillen.

Hoe ontstaat de aandoening?

De vernauwingen of afsluitingen zijn het gevolg van vetafzetting en verkalking in de slagadere van buik of bekken (zie afbeelding 1). Dit heet atherosclerose. Voor atherosclerose bestaan verschillende oorzaken: roken, hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Waarom een operatie?

Door de vernauwingen of afsluitingen stroomt er minder bloed naar uw benen. Daardoor kunt u, na een klein stukje lopen, pijn in één of beide benen krijgen. Dit verdwijnt weer na korte tijd rust. Niet bij iedereen is een operatie noodzakelijk, maar soms kan het de enige manier zijn om van de klachten af te komen. Het is ook mogelijk dat er zo weinig bloed naar uw benen stroomt, dat u zelfs pijn heeft als u rust of 's nachts in bed ligt.



Afb. 1

De slechte bloeddorstrooming kan ook zweren -die niet genezen- of afsterving van één of meer tenen veroorzaken. In die gevallen is een operatie noodzakelijk om de doorstroming van de benen te verbeteren. Niet opereren kan na bepaalde tijd een amputatie (afzetting) van het been betekenen.

Het kan voorkomen, dat er slagaders helemaal zijn afgesloten, maar dat u geen klachten heeft. Dan is een operatie niet altijd nodig. Wel moet u dan zoveel mogelijk lopen en niet roken.

In bepaalde gevallen kan de arts een vernauwing oprekken met een ballon (dotteren).

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving.

Met een bloedvat van kunststof (vaatprothese) overbrugt de chirurg het vernauwde of afgesloten deel van de slagader. Deze vaatprothese heeft de vorm van een omgekeerde Y, ook wel broekprothese genoemd (afbeelding 2).

Via een buikoperatie sluit de chirurg de vaatprothese op de grote buikslagader aan. De beide andere uiteinden bevestigt hij voorbij de vernauwingen of afsluitingen aan de slagaders.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:


Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

Dikwijls worden hiervoor aparte sneden in de liezen gemaakt (afbeelding 2). Na de operatie wordt u een of meer dagen op de afdeling Intensive Care verpleegd.



Afb. 2

Mogelijke complicaties tijdens en na de operatie

Ondanks alle voorzorgen kunnen de volgende complicaties bij elke operatie plaatsvinden: infectie van de wond; trombose (bloedstolsel dat een bloedvat afsluit); longembolie (bloedstolsel in de longvaten); bloedingen en beschadigingen van organen of zenuwen.

Een longontsteking of een hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal. Vanzelfsprekend worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om complicaties te voorkomen of vroegtijdig te onderkennen. Bij een operatie worden gevoelszenuwen in de huid doorgesneden. Dit kan een doof gevoel geven in de huid bij het operatielitteken. Meestal is het gevoel na enkele maanden weer terug.

Bij een vaatoperatie kunnen extra complicaties optreden:

- er kunnen nabloedingen optreden door een lekkage van de naad (verbinding) tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat;
- er kan een afsluiting ontstaan in de vaatprothese of in een beenslagader.

Als zo'n complicatie optreedt, is helaas een nieuwe operatie noodzakelijk.

Bij mannen komt het soms voor dat na de operatie de erectie gestoord is. Ook is het mogelijk dat door uitval van bepaalde zenuwen geen zaadlozing meer plaatsvindt. Een normale erectie is dan wel mogelijk. Het orgasme en de seksuele beleving raken hierdoor niet verstoord.

Mogelijk heeft u niet alleen vernauwingen of afsluitingen in de slagaders van het bekken, maar ook in de slagaders van het been. In dat geval kunt u, ook na de operatie, nog lichte klachten houden als u een tijd heeft gelopen.

Na het ontslag

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Als u medicijnen moet gebruiken, is het van belang dat u deze nauwkeurig inneemt, volgens de opgegeven dosering. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen krijgt (Sintrom, Sintrommitis of Marcoumar), moet de Trombosedienst uw bloed regelmatig controleren. Hiervoor krijgt u afspraken mee.

Een vaatoperatie is een grote operatie. Na het ontslag uit het ziekenhuis zult u merken dat u niet meteen helemaal fit bent. U raakt nog snel vermoeid en ook de eetlust is vaak wat minder. Na twee tot drie maanden is uw algemene conditie meestal weer als voor de operatie.

Ten slotte

Een gezonde levenswijze is belangrijk. Zeker na een vaatoperatie. Dat wil zeggen dat u absoluut niet mag roken. Ook is goede lichaamsbeweging van belang. Let erop dat u niet te zwaar wordt. Verder zijn er voor u geen beperkingen.

Wie kan ik bellen als er is iets mis?

Als u weer naar huis gaat, kan het zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur tot 38,0 graden Celsius is normaal. Maakt u zich daarover geen zorgen.

Heeft u andere problemen als gevolg van uw ziekenhuisopname, dan belt u:

Tot aan uw eerste controleafspraak:

- Vraagt u **tijdens kantooruren** naar de polikliniek Chirurgie.
- Vraagt u **buiten kantooruren** naar de verpleegafdeling waar u was opgenomen.

Na uw eerst controleafspraak:

- Belt u **tijdens kantooruren** met uw huisarts.
- Belt u **buiten kantooruren** met de huisartsenpost.

Vragen

Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw operatie, stelt u deze dan aan uw behandelend arts.

Het is verstandig uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

1. _____ ?
2. _____ ?
3. _____ ?
4. _____ ?
5. _____ ?
6. _____ ?

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie via het algemeen telefoonnummer van Meander Medisch Centrum 033 - 850 50 50.

20357_chi_vernauwdeslagader_jan14