

Maagslijmvliesscintigrafie (Meckel's divertikel)

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Datum onderzoek: _____

Tijdstip injectie: _____

**Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort**

Uw behandelend specialist heeft voor u een maagslijmvliesscintigrafie aangevraagd.

Doel maagslijmvliesscintigrafie (=Meckel's divertikel)

Een Meckel's divertikel is een aangeboren afwijking in de dunne darm. Soms bevat de binnenbekleding van de darm slijmvlies dat niet van de dunne darm afkomstig is. In vijftig procent van de gevallen is dat maagslijmvlies. Dit maagslijmvlies kan allerlei klachten veroorzaken.

Radioactieve stof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.

Mee te nemen naar het ziekenhuis

- Verzekeringsbewijs
- Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Medicatielijst

Verdere voorbereidingen

- Vanaf 3 dagen voor het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
- Binnen drie dagen voorafgaande aan het onderzoek mag er geen ander maag- en/of darmonderzoek hebben plaatsgevonden.
U krijgt van uw aanvragend specialist een recept mee voor het medicijn Zantac (= Ranitidine); Zantac remt de maagzuurproductie. Op de dag vóór het onderzoek neemt u 's ochtends en 's avonds 1 tablet Zantac in. Er dient 12 uur tijd tussen beide tabletten te zitten.
Op de dag van het onderzoek neemt u 2 uur vóór het onderzoek de laatste tablet Zantac in.
- Kinderen t/m 15 jaar hoeven geen tabletten Zantac in te nemen; zij krijgen Zantac per injectie toegediend voor het onderzoek.
- Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Het is belangrijk om vanaf 24:00 uur 's nachts niet meer te eten, te drinken of te roken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger dan is het van belang dat u vóór het onderzoek telefonisch contact opneemt met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 12 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfde melk mag na 3 dagen alsnog gegeven worden.

Verloop van het onderzoek

U wordt verzocht vlak vóór het onderzoek naar het toilet te gaan en de blaas goed leeg te plassen.

U ligt tijdens het maken van de foto's op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is van belang dat u stil blijft liggen gedurende het onderzoek.



U krijgt een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof.

Gedurende 30 minuten worden er foto's gemaakt van uw buik. Na 30 minuten is het de bedoeling dat u de blaas nogmaals leeg plast op het toilet, waarna er nog een foto gedurende 5 minuten wordt gemaakt. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

Reisverklaring

De straling, die u uitzendt blijft gedurende een aantal dagen meetbaar, ook op afstand. Op vliegvelden staan mogelijk poortjes om straling te meten.

Als u binnen 2 dagen ná het onderzoek van plan bent te gaan reizen, adviseren wij u een reisverklaring aan ons te vragen. De reisverklaring vermeldt onder meer dat u onderzocht bent met Tc-99m en het stralingsniveau in uw omgeving ten tijde van de reis. U vermijdt met de verklaring eventueel een langdurig oponthoud.

Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte

De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Juni2017