

Huidallergietest

Uw specialist heeft één of meer onderzoeken op de afdeling Longfunctie voor u aangevraagd in Meander Medisch Centrum. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen. Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om algemene informatie. Omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. We vertellen u aan welke zaken u moet denken, hoe u zich kunt voorbereiden op het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt.

Het onderzoek

Een allergietest toont aan voor welke stoffen u mogelijk allergisch (overgevoelig) bent. Inademen van stoffen waarvoor u allergisch bent, kunnen klachten aan de luchtwegen en huid veroorzaken. Om te onderzoeken voor welke stoffen u overgevoelig bent, brengt de longfunctieanalist een reeks van deze stoffen in de huid. Dit gebeurt met kleine prikjes. Tevens wordt een standaardreactie opgewekt met behulp van histamine: een positieve controle. Hiermee kunnen eventuele reacties worden vergeleken. Nadat de prikjes geplaatst zijn, werken deze 15 minuten in. Daarna wordt de grootte van de eventuele reactie gemeten. Wanneer u reageert op het prikkelende stofje, ontstaat een bultje op uw huid. U kunt dit vergelijken met een muggenbultje. Eventuele reacties trekken vanzelf weer weg. Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij van u verwacht. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Vorbereiding op het onderzoek

- U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
- Het is niet wenselijk om kinderen mee te nemen naar een longfunctieonderzoek. Bij sommige onderzoeken is het zelfs niet mogelijk dat kinderen aanwezig zijn. Er is gratis kinderopvang voor kinderen van 1 tot 6 jaar in het KinderPark van Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort.
- Op de dag van het onderzoek mogen de onderarmen niet ingesmeerd worden met bodylotion of andere crème.
- Indien u zwanger bent, of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, geeft u dit dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak niet door zal gaan of dat de afspraak verplaatst wordt.
- Indien u een corticosteroid bevattende zalf op de onderarmen gebruikt of orale corticosteroiden (bijv. Prednison), geeft u dit dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak niet door zal gaan of dat de afspraak verplaatst wordt.
- Antihistaminica dienen 72 uur voor het onderzoek gestaakt te worden:
 - Cetirizine (Prevalin, Reactine, Revalintabs, Zyrtec)
 - Clemastine (Tavegil)
 - Cinnarizine/cyclizine (Primatour)
 - Deslaratadine (Aerius)
 - Fexofenadine (Telfast)
 - Ketotifen (Zaditen)
 - Loratidine (Allerfree, Claritine)
 - Levocetirizine (Xysal)
 - Zie de volgende pagina voor het vervolg van de medicatielijst.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

-
- Phenergan (Promethazine)
 - Rupatadine (Rupafin)
 - Terfenadine (Triludan)

Neem contact op met de afdeling Longfunctie als u vragen heeft over het wel/ niet door gebruiken van u medicatie.

Uitslag

De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?

De afdeling Longfunctie bevindt zich op de 3^e etage van Meander Medisch Centrum: u kunt zich melden bij de ontvangstbalie op de 3^e etage (Brink).

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Longfunctie via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. U krijgt een telefonist(e) aan de lijn, hij/zij verbindt u door met de afdeling.