

Echogeleide needling (barbotage)

Na overleg met uw arts heeft u besloten een echogeleide barbotage te laten verrichten. Hieronder geven wij u informatie over deze behandeling.

Doel

Kalk in een pees is waarschijnlijk de oorzaak van uw klachten. Deze barbotage-behandeling heeft als doel het lichaam aan te zetten tot het oplossen van de kalk uit de pees.

Het onderzoek

Na wat echogel (geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de radioloog met een klein apparaatje (transducer) over de huid. Deze transducer zendt (ultra)geluidsgolven uit, die door structuren in uw lichaam worden teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven vormen een beeld op de monitor. Dit beeld wordt vastgelegd en bewaard. Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen. Het te behandelen lichaamsdeel dient ruim ontbloot te worden. Met behulp van het echobeeld bepaalt de radioloog de plaats waar geprikt gaat worden.

U krijgt een steriele doek over de te behandelen plek. De huid en het onderliggende weefsel worden plaatselijk verdoofd. Hierna wordt de kalk in de pees stuk geprikt. A vooraf of aansluitend wordt er geprobeerd wat van de kalk op te zuigen. Bij een barbotage van de schouder spuiten we aan het eind van het onderzoek medicatie (corticosteroiden) in om een ontsteking van de slijmbeurs te onderdrukken. Het is bij deze behandeling niet mogelijk om de kalk te verwijderen; de bedoeling is het lichaam aan te zetten dit zelf te doen. Mocht u tijdens het onderzoek pijn ervaren geeft u dit dan aan. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.

Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de echografist of echoassistente. Indien het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een tolk), geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.

Voorbereiding

Voor een barbotage is geen speciale voorbereiding nodig. Bij gebruik van bloed verdunnende medicatie graag medicatielijst meenemen.

Het is niet wenselijk dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.

Zie voor meer informatie onderstaande link:

<https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f1-03caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES>

of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder patiëntfolders.

Na het onderzoek

We raden u af om na afloop van het onderzoek een auto te besturen. Het is belangrijk dat u na de behandeling normaal blijft bewegen.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Mogelijke bijverschijnselen

- Enige uren tot ongeveer drie dagen na de injectie kunt u toename van de pijn ervaren. Dit is normaal. De pijn moet na enkele dagen wel afnemen. Om de pijn tegen te gaan kunt u, naast de pijnstiller waarvan u het recept heeft meegekregen, per dag 6 tabletten paracetamol van 500 mg innemen.
- Rode verkleuring in het gelaat, een zogenaamde flush.
- U kunt zich wat koortsig voelen.
- Verstoring van de menstruatiecyclus, soms bloedverlies na de menopauze.
- Verstoring in het suikergehalte bij diabetespatiënten (meestal verhoging bij insulineafhankelijke diabetes).
- Jeuk en rode uitslag en/of bultjes over het lichaam.
- Op de plaats waar de injectie is gegeven, kan een klein wit (pigmentloos) plekje ontstaan.

Dit zijn de meest voorkomende bijverschijnselen. Indien u dit wenst kunnen wij u de bijsluiter van de fabrikant meegeven.

U moet contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd als de plek van de injectie rood, glimmend en zéér warm is.

Wat neemt u mee?

- Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
- Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
- Geldig identiteitsbewijs

Contact

Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050, vragen naar de afdeling Radiologie.