

Overzicht serologische vervolgonderzoeken.

Dit betreft vervolgonderzoeken die bij bepaalde positieve testuitslagen door het laboratorium worden uitgevoerd om tot een correcte en volledige uitslag te komen.

Verwekker	Test(en)	Uitslag	Vervolgonderzoek (op initiatief lab)
Hepatitis B virus	EIA HBsAg en anti-HBcore	HBsAg pos. (nieuwe bevinding) HBsAg pos. (bekend positief) HBsAg neg., anti-HBcore pos.	confirmatie HBsAg/anti-HBs/anti-HBe/HBeAg (evt anti-HCV totaal en anti-HAV IgG) anti-HBs, indien anti-HBe eerder negatief: anti-HBe en HBeAg anti-HBs/anti-HBe/HBeAg
Hepatitis C virus	EIA HCV Ig (tot)	pos. (nieuwe bevinding)	immunoblot HCV, indien positief tevens PCR HCV
Hepatitis A virus	EIA HAV IgM	pos.	IgG anti-HAV
HIV	EIA HIV Ag/Ab combo	pos.	ELFA HIV combo en immunoblot HIV Ig
Trep. pallidum/Syfilis/Lues	EIA Trep. pall. Ig (tot)	pos. (nieuwe bevinding) pos. (bekend positief)	immunoblot Treponema pallidum, VDRL VDRL
Toxoplasma gondii	EIA Toxo IgM en IgG	IgM en IgG pos.	Toxo IgG aviditeitsindex
Cytomegalovirus	EIA CMV IgM en IgG	IgM en IgG pos. IgM pos. en IgG neg.	ELFA CMV IgM, evt CMV IgG aviditeitsindex, EBV serologie en/of CMV serologie in eerder serum ELFA CMV IgM en evt EBV serologie
Epstein Barr virus	EIA EBV-VCA-IgG, VCA-IgM en EBNA	diverse profielen niet conclusief	afh. van serol. profiel: heterofiele antistoffen, CMV serologie en/of EBV serologie in eerder serum
Borrelia burgdorferi/Lyme	EIA Borrelia burgd. IgM en IgG	IgM en/of IgG pos. (nieuwe bevinding)	immunoblot Borrelia burgd. IgM en/of IgG (geen IgG blot indien IgG sterk positief)