

LHRH-test (= GnHR)

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Moeder Kind van Meander Medisch Centrum. In deze folder informeren wij u en uw kind over de LHRH-test, ook wel GnHR-test genoemd. Waarom is deze test nodig? Wat gebeurt er tijdens de test? Hoe lang duurt de test? Wanneer krijgt u de uitslag van de test?

We geven u en uw kind informatie over de eventuele voorbereiding thuis en hoe u contact kunt opnemen met de afdeling waar de test plaatsvindt.

Wat is een LHRH-test (= GnHR)?

Een LHRH-test is een test om de puberteitsontwikkeling te onderzoeken. LHRH (= GnHR) is een hormoon dat door de hersenen geproduceerd wordt. Dit hormoon stimuleert de hypofyse om de hormonen LH en FSH af te scheiden. Deze hormonen stimuleren op hun beurt de geslachtsklieren tot het maken van de geslachtshormonen. Als de hypofyse minder goed werkt, kan dit een stoornis geven in de puberteitsontwikkeling.

Vorbereiding

- Uw kind mag voor en na deze test gewoon eten en drinken.
- Als uw kind medicijnen gebruikt, laat hem/haar deze op de normale tijd innemen, tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
- U en uw kind melden zich op _____ dag, _____ om _____ uur op de afdeling Kinderdagverpleging.
- Als voorbereiding op het inbrengen van het infuus brengt de verpleegkundige bij uw kind op beide elleboogholtes en/of op de bovenkant van de handen een verdovende pleister aan. Daardoor ervaart uw kind minder pijn bij het inbrengen van het infuusnaaldje.
- De pedagogisch medewerker bereidt u en uw kind voor op wat er gaat gebeuren met behulp van een fotoboek en beeldvormend materiaal.

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen, indien uw kind voorafgaand aan deze test:

- ziek is geworden,
- koorts heeft (boven 38.0 graden Celsius),
- in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte,
- op een veehouderij woont,
- in de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis is geweest voor behandeling,
- contact heeft gehad met dragers van de MRSA-bacterie.
 - Dit kan betekenen dat de test verzet moet worden.
- Broertjes en zusjes kunnen niet mee.
- Makkelijk zittende kleding en geen strakke mouwen is voor uw kind het prettigst in verband met het infuus in de arm.
- Neem iets vertrouwd mee zoals een knuffel of speen.
- Neem eventueel voor uzelf iets te eten mee.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

De test

- De verpleegkundige verwijdert de pleister uit de elleboogholtes van uw kind.
- Een kinderarts brengt het infuusnaaldje in de ader van de arm. Dit gebeurt op de onderzoektafel in een behandelkamer van de afdeling (dit is te vergelijken met de bloedafname op het laboratorium).
- Bij het inbrengen van het infuusnaaldje wordt er bloed afgenomen voor onderzoek.
- Gedurende de hele test blijft het infuus in de arm zitten. Het infuus wordt vastgezet met een spalkje en een verbandje om te voorkomen dat het naaldje voortijdig uit het bloedvat gaat.
- Via het infuusnaaldje dient de kinderarts het medicijn toe dat uw kind nodig heeft voor deze test, dit is niet pijnlijk.
- Bijwerkingen van dit medicijn zijn: lichte misselijkheid, duizeligheid en een warm gevoel (deze verschijnselen kunnen enkele minuten duren na de toediening van het medicijn).
- De verpleegkundige neemt gedurende de hele test op afgesproken tijden bloed af. Dit wordt via een 'kraantje' aan het infuus gedaan en uw kind zal daar geen pijn aan hebben.
- In totaal neemt de verpleegkundige drie keer bloed af. Tussen het afnemen van het bloed kunnen u en uw kind gebruik maken van de speelkamer of uw kind kan eventueel op zaal gebruikmaken van een bed.
- Als de test is afgelopen, wordt het infuus met spalkje en verband verwijderd. Op het insteekgaatje wordt een pleister geplakt, dit is niet pijnlijk.
- Deze opname duurt 2 tot 3 uur.

Na de test

- Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig.
- Sommige kinderen kunnen wat hoofdpijn krijgen of worden misselijk.
- Het tijdens de test toegediende medicijn wordt uit geplast. Hier merkt uw kind niets van.
- De pleister van het infuus kunt u bij thuiskomst verwijderen.
- Met de kinderarts heeft u een (telefonische) afspraak voor de uitslag van de test.

Contact

- Tot één week na het onderzoek belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na het onderzoek neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.