

Urodynamisch onderzoek

Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek gedaan. Doel van dit onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten. Vaak wordt een urodynamisch onderzoek gedaan als iemand moeilijk plast of ongewild urine verliest (incontinentie).

Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de blaas en de spieren. Het is een inwendig onderzoek.

Door middel van dunne slangetjes die ingebracht worden via de plasbuis en de endeldarm kunnen uw blaasinhoud, uw blaasdruk, de afsluiting van uw blaas, uw eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in uw bekkenbodemspieren gemeten worden.

De meetresultaten worden met een computer verwerkt.

Het onderzoek duurt ongeveer dertig tot veertig minuten.

Vorbereiding

Voor het onderzoek moet u geplast hebben, verder is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

U wordt onderzocht op de polikliniek Urologie. Dit gebeurt meestal door een verpleegkundige. Zij wijst u een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam uittrekt. De kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Soms moet u uitplassen op een speciaal toilet, waarbij de kracht van de straal gemeten wordt.

Het onderzoek kan pas beginnen als u een lege blaas heeft. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel, waarbij u met opgetrokken, gespreide benen gaat liggen. Er wordt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in uw blaas gebracht. Via deze katheter wordt tijdens het onderzoek de blaas gevuld.

De tweede katheter wordt via uw anus in de endeldarm ingebracht, voor meting van de druk. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar kan u wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met pleisters, zodat deze op hun plaats blijven.

Op de billen rondom de anus worden enkele elektrodeplakkers (snoertjes naar de computer) bevestigd, waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten wordt.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt in principe zittend plaats op een soort toilet of eventueel liggend op een speciale onderzoekstafel.

Via het slangetje in de blaas wordt de blaas gevuld met steriel water.

Tijdens het vullen wordt door de computer de druk in de blaas gemeten en via de katheter in de endeldarm de druk in de buik.

Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit zeggen. Tijdens het onderzoek vragen we u meerdere keren om te hoesten of te persen. Dit is vooral belangrijk als u last heeft van ongewild urineverlies (incontinentie).

De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen hebt en de plas niet meer op kunt houden.

Dan wordt het vullen gestopt.

Als de verpleegkundige het u zegt, kunt u uitplassen langs het slangetje in de plasbuis.

Daarna worden slangetjes en plakkers verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Nazorg

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Meestal krijgt u hiervoor een aparte afspraak. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis.

Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk of branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kunt u een verhoogde drang tot plassen hebben. Dit komt doordat uw plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes.

Bij sommige patiënten kunnen de bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is normaal.

Soms verliest u bloed via de plasbuis. Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken.

Wanneer u na het onderzoek lang klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts heeft, of indien u veel moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw uroloog.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u uw afspraak niet na kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze folder bevat algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden.

Aan het begin van het onderzoek zal de verpleegkundige u vertellen wat er gaat gebeuren.

Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, is er altijd gelegenheid om deze te stellen.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Urologie.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Maandag t/m vrijdag: van 08.00 - 16.30 uur.

De polikliniek is bereikbaar via het afsprakennummer 033 - 850 60 70.