

Imuran (Azathioprine)

Uw reumatoloog heeft u Imuran voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.

Het effect van Imuran

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Imuran is zo'n medicijn. Na enige tijd kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Het kan echter wel 2 tot 4 maanden duren voordat u merkt dat dit medicijn begint te werken. Indien Imuran een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u last heeft van de bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van Imuran stop te zetten.

Het gebruik samen met andere medicijnen

Over het algemeen kunt u Imuran samen met bijna alle andere geneesmiddelen gebruiken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u dit gebruik blijven voortzetten. Als u Imuran gebruikt samen met Allopurinol (bij jicht), zal de reumatoloog de dosering van Imuran aanpassen. Houdt uw huisarts en specialist wel op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt. Hiervoor kunt u eventueel een geneesmiddelenpaspoort gebruiken. Dit is verkrijgbaar bij de apotheek.

Wijze van toediening

Imuran is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 mg en 50 mg. Gebruik de eerste week 1 tablet Imuran van 50 mg per dag. Hierna gebruikt u dagelijks 2 tabletten van 50 mg, tenzij de reumatoloog u anders voorschrijft. Slik de tabletten tegelijk tijdens de maaltijd door, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. U kunt de tabletten innemen met voedsel en/of melk of water. Het is belangrijk dat u ze niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u de tabletten vergeten bent, neemt u ze dan op een later tijdstip nog op dezelfde dag in.

Bijwerkingen

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Ook Imuran, maar meestal niet ernstig. Vaak kunnen deze bijwerkingen worden opgespoord voordat zij tot problemen leiden. De meest voorkomende bijwerkingen:

- maag- en darmklachten (verminderde eetlust, vol gevoel, misselijkheid en braken).
- huiduitslag.
- gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- erge keelpijn in combinatie met koorts.

Indien u één van deze bijwerkingen opmerkt, meldt u dit dan aan uw huisarts en reumatoloog.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode meestal elke 2 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag hiervan is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op indien de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Imuran tijdens de zwangerschap en borstvoeding dient slechts na zorgvuldige overweging en in overleg met uw behandelend specialist te gebeuren.

Belangrijke informatie

- Waarschuw uw reumatoloog bij aanhoudende koorts en keelklachten, anders dan normaal, of bij langdurige griepverschijnselen.
- Als u veel last heeft van misselijkheid, neemt u dan de tabletten in voor het slapen gaan. Meestal heeft u dan minder last van deze bijwerkingen.
- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. Drink niet meer dan 1 glas per dag. In combinatie met het gebruik van Imuran is de kans groter dat u stoornissen krijgt van de leverfunctie.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend reumatoloog of reumaconsulente. Dat kan via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50 (vraagt u naar de polikliniek Reumatologie of de reumaconsulent).

mrt_2016