

Maagontledingsscintigrafie

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Datum onderzoek: _____

Tijdstip onderzoek: _____

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een maagontledingsscintigrafie aangevraagd.

Goede voorbereiding is noodzakelijk.

Het is belangrijk dat u deze folder zorgvuldig leest.

- 24 uur voor aanvang van het onderzoek mag u **niet roken, alcohol of cafeïne** nuttigen.
- Op dag van het onderzoek moet u **nuchter** zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer mag eten en drinken. Wat u wel mag, is een klein beetje water drinken.
- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de werking van de maag en/of darm beïnvloeden.

Doel maagontledingsscintigrafie

Bij een maagontledingsscintigrafie wordt gekeken, hoe snel een maaltijd door de maag naar de darmen getransporteerd wordt.

Voor het onderzoek krijgt u een pannenkoek of pap te eten. Aan de pannenkoek of pap is een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof toegevoegd. Hierdoor kan het voedsel op zijn weg door uw maag en darmen "gevolgd" worden.

De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.

Mee te nemen naar het ziekenhuis

- Verzekeringsbewijs
- Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Medicatielijst

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger dan is het van belang dat u vóór het onderzoek telefonisch contact opneemt met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 4 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfd melk mag na 3 dagen alsnog gegeven worden.

Vorbereiding van het onderzoek

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de werking van de maag en/of darm beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft. Uw specialist vult in de tabel in om welke medicijnen het gaat.

Naam medicijn	Aantal dagen dat het medicijn gestaakt dient te worden


- Andere medicijnen kunt u gewoon innemen.
- 24 uur voor aanvang van het onderzoek mag u **niet roken, alcohol of cafeïne** nuttigen.
- Op dag van het onderzoek moet u **nuchter** zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer mag eten en drinken. Wat u wel mag, is een klein beetje water drinken.

Als u suikerziekte heeft en hiervoor insuline of tabletten gebruikt, wordt het onderzoek zo vroeg mogelijk op de ochtend gepland.

- U mag vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer eten, drinken en roken.
- U injecteert de insuline of neemt uw tabletten in op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarna u de pannenkoek of pap te eten krijgt.
- Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal inzit, uit te doen.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het maken van de foto's zit u in een stoel; u wordt met de stoel voor de gammacamera gepositioneerd.



Als u begint met eten wordt er gestart met maken van de foto's. Gedurende anderhalf uur worden er foto's gemaakt van uw buik.

Als de pannenkoek of pap zich binnen anderhalf uur niet van uw maag naar uw darmen verplaatst heeft, kunnen er later op de dag nog een aantal foto's worden gemaakt.

Het is van belang dat u zo stil mogelijk blijft zitten gedurende het onderzoek.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

Reisverklaring

De straling, die u uitzendt blijft gedurende een aantal dagen meetbaar, ook op afstand. Op vliegvelden staan mogelijk poortjes om straling te meten.

Als u binnen 2 dagen ná het onderzoek van plan bent te gaan reizen, adviseren wij u een reisverklaring aan ons te vragen. De reisverklaring vermeldt onder meer dat u onderzocht bent met Tc-99m en het stralingsniveau in uw omgeving ten tijde van de reis. U vermijdt met de verklaring eventueel een langdurig oponthoud.

Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte

De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.