

Liesbreuk bij kinderen

Uw kind is opgenomen op de afdeling Moeder Kind van Meander Medisch Centrum. In deze folder informeren wij u over een liesbreuk bij kinderen. Wat is een liesbreuk, wat zijn de klachten en wat kan eraan gedaan worden? Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk (hernia inguinalis) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De darm kan door deze opening zakken, waardoor een zwelling in de lies zichtbaar wordt.

De opening in de buikwand ontstaat al in een vroeg stadium van de zwangerschap in het liesgebied van de foetus (het lieskanaal).

Bij jongetjes zullen hierlangs in een latere fase de zaadbuis en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar het scrotum (balzak). Bij meisjes ontstaat hierin een ophangband van de baarmoeder naar de grote schaamlip.

Klachten

Liesbreuken komen vaker bij jongetjes voor dan bij meisjes. Over het algemeen hebben kinderen weinig last van deze afwijking. Er is een zichtbare bult in de lies, die wel of niet weg te drukken is. Soms echter kan het gepaard gaan met pijnklachten. In deze uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van het beklemd raken van de buikinhoud in de breuk. Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf, daarom wordt altijd een operatieve behandeling geadviseerd.

De operatie

De chirurg neemt de uitstulping weg via een snede in de lies van het kind. Daarna wordt de wond gehecht. Deze operatie wordt uitgevoerd onder algehele verdoving (narcose) in dagbehandeling. De kans dat de liesbreuk terugkomt is niet groot. De kans dat later blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat, is heel klein.

Onze pedagogisch medewerkers helpen u graag bij de voorbereiding van u en uw kind op deze operatie. Zie de folder 'Voorlichting op operaties, onderzoek en/of test voor kinderen'.

Adviezen voor thuis

Lichamelijke verzorging

Op de dag na de operatie mag uw kind douchen of in bad. De gebruikte pleister geeft voldoende bescherming

Voeding

Uw kind mag weer normaal eten als hij dat wil.

Wondverzorging

De pleister kunt u na 5-7 dagen verwijderen tenzij de arts anders met u besproken heeft.

Hechtingen

De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven dus niet verwijderd te worden.

www.meandermc.nl
www.mijnmeandermc.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Pijn	De eerste 24 uur na de operatie mag u uw kind standaard elke 6 uur paracetamol zetpillen/ tabletten geven, volgens voorschrift in de bijsluiters, om de pijn te bestrijden. Daarna eventueel alleen in de ochtend en voor het slapen. Pijn bij het spelen is een natuurlijke rem om het rustiger aan te doen.
Afspraak urineren	Het is belangrijk erop te letten dat het kind na de operatie wel plast. Als hij eenmaal geplast heeft, is het goed.
Wat mag wel en niet	Uw kind geeft zelf aan wat hij/zij wel en niet kan.
Mogelijke complicatie	Iets nabloeden kan. Maar als het teveel wordt, bijvoorbeeld als de pleister flink doorweekt raakt, dan moet u even contact opnemen met de afdeling. Aanhoudende temperatuursverhoging boven de 38.0 graden Celsius is ook een reden om te bellen. Mocht de wond gaan nabloeden of zijn er andere problemen, bijvoorbeeld niet (kunnen) plassen, dan kunt u contact opnemen met het ziekenhuis.

Wanneer moet u waar zijn voor de controleafspraak?

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u van ons een afspraak voor controle op de polikliniek Chirurgie als de arts dat noodzakelijk vindt.

Contact

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse opname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een **behandeling in dagopname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Vragen

Heeft u voor of na de operatie nog vragen, stelt u deze gerust aan de behandelend arts van uw kind. Het is verstandig om uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

1. _____ ?
2. _____ ?
3. _____ ?
4. _____ ?

Telefoonnummers

U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Vraagt u naar de afdeling waar uw kind was opgenomen.

Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.