

Pleurapunctie

U heeft vochtophoping rondom uw longen. Deze vochtophoping kan de long in verdrukking brengen en zo benauwdheid veroorzaken.

Een pleurapunctie is een onderzoek waarbij de arts met een naald wat vocht tussen de longvliezen wegneemt. Op deze manier kan achterhaald worden wat de oorzaak van de vochtproductie is. In de meeste gevallen wordt dit vocht onderzocht in het laboratorium.

Omdat het longvocht benauwdheid kan veroorzaken, kan de punctie ook ter verlichting worden gedaan. De arts neemt dan eveneens door middel van een naald vocht weg.

De voorbereiding

U mag gewoon eten voor het onderzoek.

Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Ascal, Xarelto, Sintrommitis of Marcoumar, meldt u dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

Op de dag van uw longpunctie mag u zich melden op de afdeling Dagbehandeling C7. Tijdens het onderzoek zit u op de rand van het bed of de onderzoektafel. U hoeft alleen uw bovenlijf te ontbloten. De huid wordt ter plaatse gedesinfecteerd. Met een dunne naald worden de huid en het longvlies door middel van een injectie verdoofd. Dit voelt aan als een gewone bloedprik en wordt als licht pijnlijk ervaren. Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos. Er kan na het onderzoek wel een hoestprikkel ontstaan.

De longarts staat meestal achter uw rug en brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen. Op de punctienaald zit een spuit, waarmee vocht wordt opgezogen.

De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10 minuten, soms wat langer als langzaam veel vocht moet worden afgezogen bij een verlichtende punctie. Op het wondje wordt een pleister gedaan.

Na het onderzoek

Het is verstandig om het na het onderzoek een half uurtje rustig aan te doen. Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, worden nog röntgenfoto's gemaakt om het effect van de longpunctie goed te beoordelen.

Bij een longpunctie ontstaan soms complicaties zoals een bloeding. In een enkel geval treedt bij een longpunctie een kleine luchtlekkage op, waardoor u een klaplong (pneumothorax) kunt krijgen. Om de klaplong te verhelpen krijgt u een dun slangetje (drain) in de borstholte om de lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer ontplooien. Het aanbrengen van het slangetje gebeurt onder plaatselijke verdoving. Om te herstellen, verblijft u enkele dagen op de afdeling.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Tot slot

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een meerdaagse opname geldt:

- Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een behandeling in dagopname geldt:

- Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.