

Echogeleide toediening van medicatie

Na overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van uw pijnklachten. Hieronder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Vorbereiding

Voor een injectie met medicatie is geen voorbereiding nodig.

Het is niet wenselijk dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.

Zie voor meer informatie onderstaande link:

<https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f1-03caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES>

of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder patiëntfolders.

In verband met hygiëne voorschriften is het niet mogelijk om bezoekers mee te nemen tijdens de interventie. Indien het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek (zoals ouder bij een klein kind, tolk ed.) geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.

Het onderzoek

Het te prikken lichaamsdeel dient ruim ontbloot te worden. Bij een echogeleide injectie spuit de radioloog een combinatie in van pijnstilling en ontstekingsremmer (Kenacort). "Echogeleid" wil zeggen dat het prikken gebeurt met behulp van echografie. Echografie is een onderzoekstechniek waarbij met behulp van ultrageluidsgolven organen of structuren zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen.

Na wat echogel (geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de radioloog met een klein apparaatje (transducer) over de huid om de plaats van de injectie te bepalen. De huid wordt ontsmet en de injectie wordt gegeven. Na afloop wordt de prikplaats afgedekt met een pleister. Het onderzoek duurt ongeveer 15-20 minuten. Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de echografist of echoassistente.

Mogelijke bijverschijnselen

- Enige uren tot ongeveer drie dagen na de injectie kunt u toename van de pijn ervaren. De pijn moet na enkele dagen wel afnemen.
- Tijdelijk een stijf gevoel.
- Rode verkleuring in het gelaat, een zogenaamde flush.
- U kunt zich wat koortsig voelen.
- Verstoring van de menstruatiecycclus, soms bloedverlies na de menopauze.
- Verstoring in het suikergehalte bij diabetespatiënten voor 2 tot 3 weken (meestal verhoging bij insulineafhankelijke diabetes).
- Jeuk en rode uitslag en/of bultjes over het lichaam.
- Op de plaats waar de injectie is gegeven, kan een klein wit (pigmentloos) plekje ontstaan.

Dit zijn de meest voorkomende bijverschijnselen. Indien u dit wenst kunnen wij u de bijsluiters van de fabrikant meegeven. **U moet contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd als de plek van de injectie rood, glimmend en zéér warm is.**

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Wat neemt u mee?

- Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
- Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
- Geldig identiteitsbewijs

Let op de juiste locatie!

Contact

Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050, vragen naar de afdeling Radiologie.