

Ooglidcorrectie door de oogarts

In deze folder willen wij u informeren over een ooglidcorrectie. Waarom gebeurt het, wat gebeurt er tijdens de operatie, wat moet u doen na de operatie en welke risico's zijn er aan verbonden?

Waarom een ooglidcorrectie?

Bij de oogleden kunnen afwijkingen ontstaan die aanleiding geven tot klachten. Mensen worden bijvoorbeeld belemmerd bij het zien omdat ze tegen overtollige huid aankijken, hebben traanklachten of hebben last van wimperharen die tegen de ogen aan komen.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De operatie van de oogleden gebeurt in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving. Bij de bovenoogleden en/of onderoogleden verwijderd de oogarts de overtollige huid en zo nodig het onderliggende spier- en vetweefsel. De littekens bij de bovenoogleden worden gelegd in de plooi en zijn daardoor weinig zichtbaar.

Na de operatie

De eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zitten er soms bloeduitstortingen. Dit oogt niet zo fraai. U kunt eventueel een zonnebril dragen om het wat minder te laten opvallen. Na enkele dagen verwijderen wij de hechtingen.

Door de vorming van een litteken kan het ooglid wat trekken. Het kan meerdere weken tot maanden duren voordat dit helemaal tot rust komt. Ook kan er langdurig een doof gevoel van de huid van de oogleden, een strak litteken of vochtophoping ontstaan. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf.

Het resultaat van een ooglidcorrectie is meestal blijvend, maar hangt wel af van verdere verslapping van het weefsel.

Wat zijn de risico's?

De operatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kunnen we nooit garanties geven voor het resultaat van de ingreep. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een infectie, een bloeduitstorting of een gevoelloze huid. Dit is meestal niet ernstig. Ook absolute symmetrie (links en rechts gelijk) kan niet altijd worden bereikt. Soms is het noodzakelijk een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3751 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Leefregels bij ooglidcorrectie

Ten minste een week vóór de ingreep koopt u bij de drogist of apotheek de volgende middelen:

- Vitamine C 500mg tabletten, dosering: 3x daags twee tabletten
- Arnika D6 1 flacon, dosering: 3x daags 20 druppels in water opdrinken

U begint hiermee 1 week vóór de operatie en gaat hiermee door tot één week na de operatie. Totaal dus 2 weken.

Verdere aanbevelingen na de operatie zijn:

- Huid rond de ogen droog houden
- Gebruik aspirines of bloedverdunners in overleg met de oogarts
- Extra hoofdkussen 's nachts
- Zonnebril meenemen
- Bukken met een rechte rug
- Eventueel een coldpack gebruiken, te verkrijgen bij de drogist (bewaar de coldpack gewoon in de koelkast en niet in de vriezer)

Na de operatie kunt u beter niet zelf naar huis rijden. Neemt u iemand mee die u naar huis kan rijden.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u voor meer informatie bellen naar de polikliniek Oogheelkunde: 033 – 850 60 70 tussen 08.00 uur en 16.30 uur.