

Echogeleide punctie/biopsie van de lever

Na overleg met uw arts heeft u besloten een biopsie van de lever te laten verrichten. Hieronder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Wat is een leverbiopsie?

Bij een leverbiopsie wordt met een dunne, holle naald (biopsienaald) wat weefsel uit de lever weggenomen voor onderzoek. Om de juiste plaats voor de biopsie te bepalen wordt gebruik gemaakt van echografie.

Voor het onderzoek

Voor een biopsie van de lever wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling dagbehandeling of een verpleegafdeling.

2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken. In verband met hygiëne voorschriften is het niet mogelijk om bezoekers mee te nemen tijdens de interventie. Indien het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek (zoals ouder bij een klein kind, tolk ed.) geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.

Let op:

Gebruikt u antistollingsmedicatie (tabletten tegen trombose), Ascal, pijnstillers of acetylsalicylzuur, meldt dit dan aan uw behandelend arts en voorafgaand aan het onderzoek.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel.

Na wat echogel (geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de radioloog met een klein apparaatje (transducer) over de buik om de juiste plaats voor de biopsie te bepalen. Deze transducer zendt (ultra-)geluidsgolven uit, die door structuren in uw lichaam worden teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven vormen een beeld op de monitor. Dit beeld wordt vastgelegd en bewaard.

Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen.

De huid wordt ontsmet en verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de huid. De biopsienaald wordt onder geleide van het echoapparaat ingebracht en er wordt een biopt (weefsel voor onderzoek) genomen. Om voldoende weefsel te verkrijgen voor het stellen van een diagnose worden meestal twee of drie biopsies verricht.

Tijdens het onderzoek wordt u soms gevraagd in te ademen en de adem stil te houden. Mocht u pijn ervaren geeft u dit dan aan bij de assistente. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.

Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de echografist of echoassistente. Indien het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een tolk), geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een drukverband op het wondje. Hierna wordt u teruggebracht naar de afdeling. U moet nog minstens 2 uur op bed liggen en nuchter blijven. De eerste week na de biopsie adviseren wij u geen zware lichamelijke inspanning te verrichten. Daarna kunt u weer alles doen.

Uitslag

De uitslag van de echo en de punctie wordt naar uw specialist gestuurd.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Wat neemt u mee?

- Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
- Geldig identiteitsbewijs

Contact

Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde. Telefoonnummer: 033 8505050, vragen naar de poli Interne geneeskunde.