

Anorectaal functieonderzoek

Uw arts stelt voor dat u een anorectaal functieonderzoek ondergaat. Bij dit onderzoek wordt de functie van uw endeldarm en kringspier in kaart gebracht. In deze folder leest u wat dit inhoudt.

Een anorectaal functieonderzoek bestaat uit twee onderdelen.

Er wordt een anale drukmeting (**manometrie**) uitgevoerd met behulp van een dunne katheter met opblaasbare ballon. Hiermee meten we het uithoudingsvermogen en kracht van de anale kringspieren.

Tevens wordt een **volumetrie** uitgevoerd waarbij een ballon voorzichtig wordt opgeblazen, om zo de gevoeligheid van de endeldarm te bepalen.

Voor dit onderzoek heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist.

We verwachten u voor anorectaal functieonderzoek op:

_____ dag _____ om _____ uur.

Graag melden bij Brink 111, in Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort.

Vorbereiding

Specifieke voorbereiding voor anorectaal functieonderzoek is **niet** nodig.

De laatste 10 centimeter van de endeldarm vlak boven de anus is vrijwel altijd vrij van ontlasting totdat u aandrang krijgt.

Indien u voor het onderzoek aandrang heeft, gaat u nog even naar het toilet.

Het onderzoek

Een anorectaal functieonderzoek wordt uitgevoerd door twee poliassistentes. De ene poliassistente voert het onderzoek uit, de ander assisteert.

Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Manometrie

We vragen u om het onderlichaam te ontbloten en plaats te nemen op de onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij met opgetrokken knieën.

De poliassistente die het lichamenlijk onderzoek uitvoert, zal achter u plaatsnemen.

Wanneer er tijdens het inbrengen van de katheter ontlasting wordt aangetroffen, zal de poliassistente voorstellen een microlax klysma in te brengen. Na het inbrengen van het klysma heeft u de gelegenheid even naar het toilet te gaan. Wanneer anus en endeldarm vrij zijn van ontlasting, kan worden gestart met de drukmeting van het anale kanaal en endeldarm.

Met deze meting wordt onder meer uithoudingsvermogen en kracht van de anale kringspieren gemeten. De poliassistente brengt hiervoor een dunne katheter met ballon in via de anus. Tijdens de drukmeting vragen wij u verschillende malen om te 'knijpen', te 'persen', te 'hoesten' en de anus langdurig aan te spannen. Na deze metingen wordt de katheter verwijderd.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Volumetrie

De ballon wordt in kleine stapjes gevuld met lucht. De poliassistente zal u vragen om aan te geven wanneer u het eerste gevoel van 'vulling' waarneemt, het eerste gevoel van 'aandrang' en wanneer u het gevoel van 'onhoudbare aandrang' voelt. Op deze manier wordt de gevoeligheid van de endeldarm voor ontlasting bepaald. De katheter wordt vervolgens verwijderd.

Na het onderzoek

Na afloop zal de poliassistente u van de behandeltafel afhelpen.

U krijgt een afspraak bij uw specialist voor de uitslag van het onderzoek.

De poliassistenten kunnen na afloop GEEN voorlopige uitkomst met u bespreken. De arts beoordeelt en interpreteert de metingen op een later tijdstip.

Complicaties

Een anorectaal functieonderzoek is veilig, de kans op complicaties is zeer gering. In een enkel geval kan het voorkomen dat door het inbrengen van materialen via de anus, het slijmvlies van anus of endeldarm licht beschadigt met enig bloedverlies tot gevolg. Een dergelijke beschadiging herstelt in de regel zonder blijvende schade binnen 24 tot 48 uur.

Tot slot

Neemt u contact op:

- Wanneer u naar aanleiding van dit onderzoek gezondheidsklachten ondervindt.
- Wanneer u last blijft houden van anaal bloedverlies.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de poli Chirurgie via 033 – 850 60 70.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 033-850 60 70.